MARKĒJUMS
V/MRP/05/1662

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārbiņa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ThoroVAX vet.

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:
Daudzums 1 ml:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivēta	≥ 1,47 RPU (*)
Vieglās minerāleļļas	0,134 ml
Alumīnijs (alumīnija hidroksīda veidā)	1,0 mg
Tiomersāls	0,10 mg
Palīgvielas	līdz 1 ml

(*) Relatīvās vienības, ko nosaka pēc atsauces vakcīnas.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 50 ml, 2 x 50 ml, 5 x 50 ml, 10 x 50 ml.
1 x 100 ml, 2 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml.
1 x 200 ml, 2 x 200 ml, 5 x 200 ml, 10 x 200 ml.

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (nobarojamās cūkas no 7 dienu vecuma).

6. INDIKĀCIJA(-S)

Cūku aktīvai imunizācijai, lai mazinātu *Mycoplasma hyopneumoniae* izraisītu plaušu bojājumu biežumu un smaguma pakāpi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārām injekcijām. Pirms lietošanas kārtīgi saskalināt. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto instrukciju.
Nejauša injicēšana ir bīstama. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP
Pēc atvēršanas izlietot: 8 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2^{o}C - 8^{o}C).
Sargāt no gaismas.
Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/05/1662

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

MARKĒJUMS
V/MRP/05/1662

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele (PET vai DTPE)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ThoroVAX vet.

2. AKTĪVĀS VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:
Daudzums 1 ml:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivēta	≥ 1,47 RPU (*)
Vieglās minerāleļļas	0,134 ml
Alumīnijs (alumīnija hidroksīda veidā)	1,0 mg
Tiomersāls	0,10 mg
Palīgvielas	līdz 1 ml

(*) Relatīvās vienības, ko nosaka pēc atsauces vakcīnas.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml
200 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (nobarojamās cūkas no 7 dienu vecuma).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārām injekcijām.
Pirms lietošanas kārtīgi saskalināt.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP
Pēc atvēršanas izlietot: 8 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2^{o}C - 8^{o}C).
Sargāt no gaismas.
Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/05/1662

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot