

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/MRP/14/0047
Poulvac NDW liofilizāts suspensijas pagatavošanai cāļiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n “la Riba”
17813 Vall de Bianya
Žirona, Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Poulvac NDW liofilizāts suspensijas pagatavošanai vistām
Balts līdz krēmkrāsas liofilizāts.
Pēc izšķīdināšanas caurspīdīga līdz bālgani necaurspīdīga suspensija (atkarībā no izmantotā ūdens daudzuma).

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra deva satur:

Aktīvā viela:

Dzīvs Ņūkāsas slimības vīruss, celms Ulster 2C:

$10^{5.7} - 10^{6.6}$ EID₅₀*

*EID₅₀ = 50 % olu inficējošā deva.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Vistu aktīvai imunizācijai, lai mazinātu Ņūkāsas slimības vīrusa izraisītās klīniskās pazīmes un mirstību.

Imunitātes iestāšanās: 21 dienas.

Imunitātes ilgums: 6 nedēļas.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vismaz 2 vakcinācijas ar vienu devu vienai vistai ar 2 - 4 nedēļu intervālu no 1 dienas vecuma izsmidzināšanas veidā.

Topošajām dējējvistām un vaislas vistām trešo vienas devas vakcināciju veikt 10 nedēļu vecumā izsmidzināšanas veidā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Šīs veterinārās zāles var izmantot ar lielāko daļu izsmidzināšanas iekārtu. Izsmidzināšanas iekārtai jābūt tīrai, bez korozijas un tā jāizmanto tikai vakcinēšanai. Ūdens daudzums uz 1000 putniem jāpiemēro izsmidzināšanas iekārtai. Tas atšķirsies atkarībā no izsmidzināšanas iekārtas veida, taču ieteicamā deva ir 0,15 - 0,5 litri ūdens uz 1000 devām (putniem).

Noņemt alumīnija vāciņu no vakcīnas flakona. Lai izšķīdinātu vakcīnas liofilizātu, noņemt gumijas aizbāzni un iemērkēt flakonu plastmasas mērtraukā ar tīru, vēsu ūdeni. Līdz pusei piepildīt flakonu ar ūdeni, uzlikt atpakaļ gumijas aizbāzni un saskalināt, lai izšķīdinātu atlikušo vakcīnu. Vakcīnas koncentrātu pievienot izsmidzinātāja tvertnē esošajā ūdenī un rūpīgi samaisīt.

Rupjā izsmidzināšana:

Pirmo vakcināciju pirmajā dzīves nedēļā veikt ar rupjo izsmidzināšanu, kad pilienu izmērs ir lielāks par 100 μm, lai izvairītos no to iekļūšanas elpceļu zemākajās daļās.

Attālumam no izsmidzinātāja līdz putnam ir jābūt apmēram 50 cm.

Smalkā izsmidzināšana:

Vecāku putnu otrajā un trešajā vakcinācijā, lai uzlabotu imunitāti, vakcīnu lietot ar smalko izsmidzināšanu vai aerosolu veidā, kad pilienu izmērs ir mazāks par 100 μm, lai vakcīna iekļūtu elpceļu zemākajos segmentos. Citu tehnisku informāciju var iegūt tieši no uzņēmuma Zoetis.

Vakcinācijas laikā un pēc tās izslēgt ventilāciju, lai izvairītos no spēcīgas gaisa plūsmas.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar lietošanas instrukciju: 2 stundas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

No mātes iegūtās antivielas (MDA) var traucēt aktīvās imunitātes attīstību.

Ja iespējams, ka nesena lauka infekcija vai vecāku ganāmpulka vakcinācija veicinājusi augstu antivielu titru un tā rezultātā augstu MDA līmeni pēcnācējiem, attiecīgi jāplāno vakcinācijas programmas laiks.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcīnas vīruss var izplatīties no vakcinētām uz nevakcinētām vistām. Nevakcinētu putnu inficēšanās ar vakcīnas vīrusu no vakcinētiem putniem neizraisa nekādas slimības pazīmes.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Dzīvs Ņūkāsļas slimības vīruss cilvēkiem var izraisīt konjunktivītu. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, izmantot individuālo aizsargtērpu, kas sastāv no aizsargbrillēm un putekļu maskas. Pēc rīkošanās ar vakcīnu vai ievadīšanas, mazgāt un dezinficēt rokas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņemt, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nesaderība:

Nesajaukt kopā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

ATĶ vet kods: QI01AD06.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.