

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/97/0637

Vitamin E + Selenium šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

BREMER PHARMA GMBH
Werkstrase 42
34414 Warburg
Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitamin E + Selenium šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Vitamīna E acetāts	100,0 mg
Nātrija selenīts	1,97 mg
Dzidrs bezkrāsains šķīdums.	

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem:
Vitamīna E un selēna nepietiekamības profilaksei un ārstēšanai. Apsūdzotās traucējumu ārstēšanai sievietēm un vīrišķās kārtas dzīvniekiem, dzimumorgānu hipofunkcija, pārošanās aktivitātes nomākums, pastāvīgi aborti, muskuļu distrofija un miopātija.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nobarojamās cūkas ar 60 – 90 kg ķermeņa svaru var uzrādīt zemu panesamību.
Liellopiem un zirgiem var novērot neparedzamu sistēmisku iedarbību, tai skaitā nāvējošu anafilaktisko šoku. Reizēm iespējamas anafilaktiskas reakcijas.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, kazas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Vienreizējai zemādas injekcijai:

Liellopiem, zirgiem	5 – 10 ml dzīvniekam
Teļiem, aitām, kazām	2 - 4 ml dzīvniekam
Cūkām	3 ml dzīvniekam
Sivēniem (līdz 20 kg ķermeņa svara)	1 ml dzīvniekam
Atšķirtiemi sivēniem (20-60 kg ķermeņa svara)	1 – 3 ml dzīvniekam
Suņiem, kaķiem	0,5 – 1 ml dzīvniekam

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ņemot vērā selēna potenciālo toksicitāti, rekomendētās devas stingri jāievēro.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām: 0 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Grūsnība un laktācija

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Klīniski akūtas pārdozēšanas simptomi ir nespecifiski, kā, piemēram, nomākums, siekalošanās un vemšana. Hroniskas saindēšanās ar selēnu gadījumā novēro alopecijas, pododermatītu ar daļēju raga kārtas atdalīšanos, locītavu skrimšļu bojājumus.

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2016

15. CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:

12 x 100 ml;

6 x 250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.