

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/MRP/13/0059

Scalibor Protectorband 0,76 g ārstnieciskā kakla siksna maza un vidēja auguma suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

vai

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Scalibor Protectorband 0,76 g ārstnieciskā kakla siksna maza un vidēja auguma suņiem
Deltamethrin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena balta 48 cm gara kakla siksna satur:

Aktīvā viela:

Deltametrīns 0,760g

Palīgviela:

Titāna dioksīds (E171) 0,285g

4. INDIKĀCIJA(-S)

Ērču (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) invāzijas kontrolei 5 - 6 mēnešus ilgi.
Asins sūcēju kukaiņu (*Phlebotomus perniciosus*) kontrolei 5 - 6 mēnešu periodā.
Novērš pieaugušu *Culex pipiens pipiens* sugas odu barošanos līdz 6 mēnešiem ilgi.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kucēniem jaunākiem par 7 nedēļām..
Nelietot suņiem ar ādas bojājumiem.

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret piretroīdiem.
Nelietot kaķiem.



NELIETOT KAĶIEM.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti novērotas lokālas ādas reakcijas (piemēram, nieze, apsārtums/izsitumi, apmatojuma zudums) kakla rajonā vai uz visas ādas, kas var norādīt uz lokālu vai vispārēju pastiprinātas jutības reakciju. Ļoti reti ir ziņots par izmainītu uzvedību (piemēram, letargiju vai hiperaktivitāti), kas bieži saistīta ar ādas kairinājumu.

Ļoti retos gadījumos novēroti kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, vemšana, diareja un pastiprināta siekalošanās.

Ļoti reti novērotas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, ataksija un muskuļu trīce. Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā pēc kakla siksas noņemšanas.

Ja rodas kāds no šiem simptomiem, kakla siksna jānoņem. Ārstēšanai jābūt simptomātiskai, jo specifisks antidots nav zināms.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums jānorāda sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)),
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem),
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem),
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem),
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

48 cm gara kakla siksna paredzēta lietošanai maza un vidēja auguma suņiem.


Uzlikšanai ap kaklu.

Viena kakla siksna paredzēta vienam sunim.

Tikai ārīgai lietošanai.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Izņemiet kakla siksnu no slēgtās aizsargpaciņas. Noregulējiet kakla siksnu ap dzīvnieka kaklu, nepievelkot to pārāk cieši. Starp kakla siksnu un suņa kaklu jāietilpst diviem blakus saliktiem pirkstiem. Izveriet siksas galu caur sprādzi un nogrieziet lieko garumu, kas pārsniedz 5 cm.



10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Kakla siksna noslēgtā folijas paciņā jāuzglabā ārējā kartona iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kartona iepakojuma un paciņas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Tā kā kakla siksna sasniedz maksimālo iedarbību pēc vienas nedēļas, kakla siksnu ieteicams uzlikt 1 nedēļu pirms dzīvnieki varētu būt pakļauti invāzijas riskam.

Nēsājot kakla siksnu, retos gadījumos var novērot ērcu piestiprināšanos. Tāpēc nelabvēlīgos apstākļos nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārvešanu ar ērcēm vai odiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Ādas bojājumu gadījumā noņemt kakla siksnu līdz simptomu izzušanai.

Mazgāšanas ietekme uz zāļu iedarbības ilgumu nav pētīta.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc kakla siksņas uzlikšanas mazgāt rokas ar ziepēm un aukstu ūdeni.

Personām ar pastiprinātu jutību pret kakla siksņas sastāvdaļām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm un ārstējamo dzīvnieku. Pastiprinātas jutības reakcijas gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.

Neļaujiet bērniem, jo īpaši jaunākiem par 2 gadiem, pieskarties kakla siksnai, spēlēties ar to vai ielikt to mutē.

Jāuzmanās, lai nepieļautu mazu bērnu ilgstošu intensīvu saskari, piemēram, gulēšanu ar dzīvnieku, kuram uzlikta kakla siksna.

Glabāt paciņu ar kakla siksnu ārējā kartona iepakojumā līdz lietošanai.

Citi piesardzības pasākumi

Neskatoties uz to, ka neregulāra saskare ar ūdeni nesamazina kakla siksņas efektivitāti, tā vienmēr jānoņem pirms suņa peldināšanas un mazgāšanas, jo aktīvā viela ir bīstama zivīm un citiem ūdenī dzīvojošiem organismiem. Suņiem jāizvairās no peldēšanās ūdenī pirmās piecas dienas pēc kakla siksņas uzlikšanas.

Grūsnība:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Laktācija:

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot kopā ar citiem ekto paraziticīdiem līdzekļiem, kas satur organofosfātus.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ja tomēr gadās, ka suns ir graužis kakla siksnu, var parādīties sekojoši simptomi: nekoordinētas kustības, trīce, siekalošanās, vemšana, stīvums pakaļkājās.

Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā.

Ja nepieciešams, simptomātiskai ārstēšanai var lietot diazepāmu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Nepiesārņot dīķus, ūdenstilpes vai notekgrāvjus ar šo produktu vai iepakojumu, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

02/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.