

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/99/0989

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BIO KILL 2,5 mg/1 ml spray uz ādas izsmidzināms aerosols mājdzīvniekiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Permetrīns 2,5 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts 10.0mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā

3. ZĀĻU FORMA

Uz ādas izsmidzināms aerosols, balta, pienveida emulsija.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Mērķa sugas

Suņi, zirgi, aitas, jūdescūciņas, kāmjī, truši, eksotiskie putni, mājputni.

4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Līdzekli lieto pret suņu, zirgu, aitu, jūdescūciņu, kāmjū, trušu, eksotisko putnu un mājputnu ektoparazītiem (blusām, utīm, ērcēm, smidžiem) un pret kukaiņiem (skudrām, mušām) un zirnekļiem.

Dzīvnieku būdu un ligzdu dezinsekcijai.

4.3. Kontrindikācijas

Nelietot kaķiem – preparāts ir toksisks kaķiem. Neļaut kaķiem uzturēties kopā ar suņiem, kuri tikko ir apstrādāti ar BIO KILL 2,5 mg/1 ml aerosolu.

4.4. Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nesmidzināt akvārijos vai dīķos – līdzeklis ir toksisks zivīm, čūskām, ķirzakām un bitēm. Neļaut dzīvniekiem 12 stundas pēc veterināro zāļu lietošanas peldēt ūdenstilpnēs, kurās ir zivis.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Nodrošināt, lai bērni nesaskaras ar dzīvniekiem 24 stundas pēc dzīvnieka apstrādes ar šīm veterinārajām zālēm.

Līdzeklis nedrīkst nonākt tiešā kontaktā ar pārtiku, dzeramo ūdeni vai bērnu rotaļlietām.

Ja līdzeklis iekļuvis acīs, izskalot tās ar ūdeni.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret permetrīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Neguliet kopā ar apstrādātajiem dzīvniekiem.

Šīm veterinārajām zālēm ir kairinoša ietekme uz elpceļiem, lietot tikai labi vēdināmās telpās.

Var kairināt ādu un gļotādu, kā arī izraisīt alerģiskas reakcijas. Ja rodas alerģiskas reakcijas, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai gļotādām, skarto vietu mazgāt ar ziepēm un siltu ūdeni.

4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Šīm veterinārajām zālēm nav ietekmes uz dzīvnieku grūsnību un laktāciju.

4.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9. Devas un lietošanas veids

Pirms lietošanas labi saskalināt!

Dzīvniekiem un putniem: līdzekli aplicē pretēji apmatojuma vai apspalvojuma augšanas virzienam, līdz dzīvnieku āda (putnu spalvas) kļūst mitras. Dzīvniekus ar garu apmatojumu vienlaikus ķemmēt.

20 izsmidzināšanas reizes (100 ml iepakojums) uz 1 kg dzīvnieka ķermeņa svara.

4 izsmidzināšanas reizes (500 ml iepakojums) uz 1 kg ķermeņa svara.

Dzīves vietas sanācija: būrus, suņu būdas, steliņģus vai staļļus apsmidzināt, līdz tie kļūst mitri, aptuveni 25ml/m² (125 inhalācijas ar 100 ml iepakojumu, vai 25 izsmidzināšanas reizes ar 500 ml iepakojumu). Ja nepieciešams, izsmidzināšanu atkārto pēc 1 – 2 nedēļām.

4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav piemērojams.

4.11. Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Aizliegts lietot produktīvajiem dzīvniekiem..

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretektoparazītu līdzekļi, insekticīdi un repelenti.

ATĶ vet kods: QP53AC04

BIO KILL aerosols satur permetrīnu (pieder sintētisko piretroīdu grupai), kuru lieto uz ādas, lai panāktu parazītu lokālu iznīcināšanu.

Iedarbības mehānisma pamatā ir parazītu nervu jonu kanālu ietekmēšana. Na⁺ un K⁺ jonu transporta traucējumi neironu membrānās izraisa depolarizāciju un palielinātu neirotransmiteru atbrīvošanos, tādējādi izraisot ekto-parazītu neiromuskulāro paralīzi. Permetrīnam ir ietekme uz pieaugušiem parazītiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrija citrāta dihidrāts

Benzilspirts

Šķidrās parafīns

Polisorbāts 20

Polisorbāts 85

Kalcija alkilbenzola sulfonāts 2 - etilheksanols

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav noteikta.

6.3. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā : 2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā no 10 līdz 40 °C.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

100 ml, 500 ml – baltas polietilēna pudeles (PET) ar mehānisku izsmidzinātāju.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6. Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

tālr.: 00420 517 318 502

fakss: 00420 517 318 653

e-pasts: comm@bioveta.cz

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/99/0989

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 06/08/1999

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 23/04/2009

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2013

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles