

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/97/0594

Biocan M suspensija injekcijām
suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a. s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Biocan M suspensija injekcijām suņiem un kaķiem

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml (1 deva) suspensijas satur -

Aktīvā viela:

Inaktivētas *Microsporum canis* veģetatīvās formas min. 500 000

Palīgvielas:

Algeldrāts

Nātrija hlorīda šķīdums pH=7.6

4. INDIKĀCIJA(-S)

Dermatomikožu, ko ierosina dermatofīts *Microsporum canis*, profilaksei un ārstēšanai suņiem un kaķiem, sākot no 12 nedēļu vecuma.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Vispārējs drudzis. Nav ieteicams vakcinēt grūsnas kuces un kaķenes.

Neveikt citas imunoprofilaktiskās procedūras vienu nedēļu pirms pirmās vakcinācijas līdz 14 dienām pēc otrās (vai trešās) vakcinācijas (izņemot, ja lieto Biocan sērijas vakcīnas).

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lokāla (parasti zirņa lieluma) audu reakcija injekcijas vietā, kura izzūd trīs nedēļu laikā. Izņēmuma gadījumos iespējamās pastiprinātas jutības reakcijas.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi

**8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN
PAŅĒMIENA**

1 ml neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, svara vai šķirnes.

Suņiem: tikai intramuskulāri pakaļkājas muskulatūrā.

Kaķiem: subkutāni apvidū aiz lāpstiņas vai intramuskulāri pakaļkājas muskulatūrā.

Ieteicams vakcināciju veikt kreisajā ķermeņa pusē, bet revakcināciju labajā pusē.

Pirmoreiz vakcinētiem dzīvniekiem jāveic revakcinācija ar 14 – 21 dienu intervālu. Terapeitiskās vakcinācijas gadījumā, ja nepieciešams, aplicē trešo vakcīnas devu 18 – 24 dienas pēc revakcinācijas.

Imunizētiem dzīvniekiem tiek ierosināta celulārā un daļēji humorālā imunitāte. Imunitāte izveidojas 1 mēneša laikā pēc revakcinācijas un ilgst ne mazāk kā 1 gadu. Lai uzturētu imunitāti, ieteicama ikgadēja revakcinācija.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas saskalināt flakona saturu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt sausā un tumšā vietā, temperatūrā 2 – 8 °C. Nesasaldēt!

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā!

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2012

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

Farmakoterapeitiskā grupa: Inaktivētas sēnīšu vakcīnas.

Zāļu forma: Suspensija injekcijām.

Mijiedarbība: *Biocan M* suspensija injekcijām vienmēr ir jālieto atsevišķi (to nedrīkst izmantot kā šķīdinātāju liofilizētajām vakcīnām vai sajaukt ar šķidrajām *Biocan* vakcīnām). Vienlaicīgi ar *Biocan M* suspensiju injekcijām citā vietā (vēlams pretējā ķermeņa pusē) var ievadīt jebkuru citu *Biocan* vakcīnu (*Puppy, P, DP, DH, DHP, DHPi, L, R, LR, C*).

Iepakojuma izmērs:

Plastikāta kārba ar vāku ar iedobēm: 10 x 1 ml; 5 x 1 ml; 2 x 1 ml; 1 x 1 ml