

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/02/1475

JODOUTER 100 mg/ml šķīdums ievadīšanai dzemdē liellopiem un cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
Ivanovice na Hané,
Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

JODOUTER 100 mg/ml šķīdums ievadīšanai dzemdē liellopiem un cūkām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

100 ml satur -

Aktīvā viela:

Povidona jods (10%) 100 mg

Palīgvielas:

Dekspantenols 2,50g

Glicerols 85% 10 g

Nonoksinols 9 0,25 g

Poloksamērs 188 1,50 g

Citronskābes monohidrāts 0,90 g

Nātrija hidroģēnfosfāta dodekahidrāts 4,35 g

Ūdens injekcijām līdz 100 ml

4. INDIKĀCIJA(-S)

Maksts kontaminācija ar urīnu (urovagīna), maksts un maksts priekšīņas iekaisums (vaginīts, vestibulīts), dzemdes kakla iekaisums (cervicīts), akūts un hronisks dzemdes gļotādas iekaisums (endometrits), ko ierosina akūta un subakūta infekcija, trihomoniāze, maksts brūces, pēcdzemdību dzemdes atonija, lohiometra, nometekļa aizture un piometra.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta hipersensitivitāte pret jodu, hipertiroidisms vai citas vairogdziedzera disfunkcijas, grūsnība.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pastiprināti jutīgiem dzīvniekiem iespējamās alerģiskas reakcijas (kairinājums u.c.); retos gadījumos iespējami vairogdziedzera darbības funkcionāli traucējumi.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Ievadīšanai dzemdē ar katetra un metrinjektora palīdzību. Aplicēt 50 līdz 150 ml šķīduma, atkarībā no maksts fizioloģiskā tilpuma.

Govīm:

- Endometrita, trihomoniāzes ārstēšanai – 1 iepakojums (150 ml). Neauglības ārstēšana jāveic *metestrus* vai *diestrus* fāzē. Cervicīta, vaginīta, vestibulīta ārstēšanai – lokāli ārstēšanai ievadīt ar preparātu piesūcinātu tamponu vai veikt irigāciju. (Tampons pēc ārstēšanas tiek izņemts.)
- Urovagīnas ārstēšanai: pirms preparāta ievadīšanas veikt masāžu, lai izvadītu urātu masu, pēc tam dzemdē ievadīt 1 iepakojuma saturu, t.i. 150 ml.
- Dzemdes atonijas un piometras ārstēšanai: veikt dzemdes dobuma skalošanu; ja šķīduma tilpums ir lielāks nekā dzemdes fizioloģiskais tilpums, nepieciešams lieko šķīdumu izvadīt no dzemdes.
- Nometekļa aiztures gadījumā: *Jodouter* ievadīšana izraisa dzemdes kontrakcijas un aptur asiņošanu; izmaina placentas konsistenci un placentu ir vieglāk atdalīt.

Nepieciešamības gadījumā ārstēšanu var atkārtot ar tādu pašu devu.

Cūkām:

Sskalot ar 150 ml preparāta vai vairāk šķīduma atkarībā no maksts fizioloģiskā tilpuma. Ārstēšana jāveic 12 stundu laikā pēc dzemdībām.

Subakūtas infekcijas izraisītas neauglības gadījumā – ievadīt 300 ml preparāta.

Nepieciešamības gadījumā ārstēšanu var atkārtot ar tādu pašu devu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ievadīšanai dzemdē ar katetra un metrinjektora palīdzību. Aplicēt 50 - 150 ml šķīduma, atkarībā no maksts fizioloģiskā tilpuma.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas!

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

Izlietot nekavējoties pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Strādājot ar šīm veterinārajām zālēm lietojiet aizsargbrilles.

Gadījumā, ja šīs zāles nokļuvušas uz ādas, mazgāt skarto vietu ar ziepēm un ūdeni. Ja pēc saskares ar ādu rodas ādas kairinājums (nieze), meklējiet medicīnisku palīdzību.

Ja šīs veterinārās zāles iekļuvušas acīs, skalot tās un acu plakstiņus ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Ja acu kairinājums neizzūd, meklējiet medicīnisku palīdzību.

Gadījumā, ja šīs veterinārās zāles iekļūst mutē vai gremošanas traktā, skalot mutes dobumu ar ūdeni; neinducēt vemšanu.

Ja rodas cita veida blakus parādības, meklējiet medicīnisku palīdzību.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

06/2012

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanas ierobežojumi - Recepšu veterinārās zāles.