

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/01/1364**

**Lotagen injector sol. ad us.vet. 14,4 mg/ml šķīdums ievadīšanai dzemdē govīm un  
sivēnmātēm**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN  
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Lotagen injector sol. ad us.vet. 14,4 mg/ml šķīdums ievadīšanai dzemdē govīm un  
sivēnmātēm**

**3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS**

150 ml satur -

**Aktīvā viela:**

Polikrezulēns (m-krezolsulfonskābes un formaldehīda polikondensāts attiecībā 14:1) 2.16 g

**Palīgvielas:**

Destilēts ūdens

**4. INDIKĀCIJA(-AS)**

Produkts paredzēts lietošanai ginekoloģijā un dzemdniecībā, kur ir noderīga tā antibakteriālā, selektīvās koagulācijas un savelkošā iedarbība.

Ginekoloģija un dzemdniecība – akūtu infekciju izraisīta neauglība, cervicīts, vaginīts, vestibulīts, dzimumorgānu trihomoniāze, urovagīna, vagīnas brūces, vagināla asiņošana.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nav

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai cita iedarbība, kas nav minēta šajā instrukcijā, lūdzu informēties par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Govis, sivēnmātes.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA**

### **Govīm**

Cervicīta, vaginīta un vestibulīta gadījumā skalot ar Lotagen injector sol. ad us.vet. šķīdumu vai uz kādu laiku ievietot ar to piesūcinātu tamponu, kas pēc ārstēšanas ir jāizņem.

### **Sivēnmātēm**

MMA sindroma ārstēšanai dzemdi skalot ar vismaz 300 ml Lotagen šķīduma. Profilakses nolūkā dzemdi skalot ar Lotagen 12 stundu laikā pēc dzemdībām.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Skat. 8. punktu.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas un sasalšanas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Izvairīties no šķīduma iekļūšanas acīs.

Šķīdumam nonākot saskarsmē ar ādas vai tekstilizstrādājumiem, nekavējoties skalot tos ar ūdeni.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

04/2011

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.