



10
mg/ml

HISTODINE®

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

30.07.2019.

EE

Intramuskulāraie vai intravenozais.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi
infolehte.

Keeluaeg:
lihale ja sōodavatele kudedele: 1 pāev,
piimale: 12 tundi.

Kōlblikkusaeg pārast vahetu pakendi
esmast avamist: 56 pāeva.
Pārast korgi lābistamist kasutada kuni:

Hoida originaalpakendis, valguse eest
kaitstult.

Hāvitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinārsēks kasutamiseks.
Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja
kāttesaamatus kohas.

Mūgiloa nr: 2034



Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland/Nyderlandai/Nīderlande

LT

Švirkšti į raumenis arba veną.
Prieš naudojant būtina perskaityti
informacinį lapelį.

Išlauka:
Skerdienai ir subproduktams – 1 para.
Pienui – 12 val.

Tinkamumo laikas, atidarius pirmą
pakuotę, – 56 paros.
Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas
būtų apsaugotas nuo šviesos.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinarijai naudojimui.
Parduodama tik su veterinariu receptu.

Saugoti nuo vaikų.

LT/2/17/2394/001

LV

Intramuskulārai vai intravenozai
lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam
pievienoto lietošanas instrukciju.

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.
Pienam: 12 stundas.

Derīguma termiņš pēc tiešā iepakojuma
atvēršanas: 56 dienas. Pēc pirmreizējas
caurduršanas izlietot līdz

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai
pasargātu no gaismas.

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet
lietošanas instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā.

V/DCP/17/0020



10
mg/ml

HISTODINE®
10 mg/ml



sūstelahus veistele
injekcinis tīrpālas galvijams
šķīdums injekcijām liellopiem

chlorphenamini maleas

100 ml

Lot/Serija:
EXP/Tinka iki: