

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1617

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

250 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litre, 5 litre

Nav paredzēta lietošanas instrukcija, jo visa nepieciešamā informācija norādīta uz marķējuma.

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Colivet oral solution

Šķīdums iekšķīgai lietošanai cūkām un mājputniem

Colistine sulphate

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Kolistīns (sulfāta veidā)..... 2 milj. SV

Palīgvielas:

Benzilalkohols 10 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums iekšķīgai lietošanai

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml

500 ml

1 l

2 l

5 l

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkām un mājputniem

6. INDIKĀCIJA(S)

Gastrointestinālo infekciju ārstēšanai, kuras ierosina neinvazīvas E.Coli baktērijas, kas ir jutīgas pret kolistīnu.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Cūkām ieteicamā deva ir 100 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa svara dienā 3-5 dienas pēc kārtas. Ieteicamo dienas devu ir ieteicams sadalīt divās daļās, ja produkts tiek ievadīts tieši dzīvnieka mutē.

Mājputniem: 75 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa svara dienā 3-5 dienas pēc kārtas.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:

Cūkām: 1 diena

Mājputniem: 1 diena

Olām: 0 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Personām, ar pastiprinātu jutību pret polimiksbīnēm vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja, sagatavojot šķīdumu, notikusi nejauša (gadījuma rakstura) izsmidzināšana acīs, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

Mazgāt rokas un neaizsargātās ādas vietas pēc lietošanas.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas vai sagatavošanas lietošanai saskaņā ar lietošanas instrukciju:

- 24 stundas dzeramajā ūdenī

- 6 stundas pienā

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZEMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CEVA SANTE ANIMALE

Zone Industrielle, La Ballastiere,

33500 Libourne,

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/03/1617

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

18. CITA INFORMĀCIJA

ZĀĻU SĒRIJAS RAŽOTĀJS:

CEVA SANTE ANIMALE

Z.I.de Tres Le Bois,

22603 Loudeac,

Francija

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta hipersensitivitāte pret polimiksīniem.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: Nav noteikti.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām, ar pastiprinātu jutību pret polimiksīniem vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja, sagatavojot šķīdumu, notikusi nejauša (gadījuma rakstura) izsmidzināšana acīs, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

Mazgāt rokas un neaizsargātās ādas vietas pēc lietošanas.

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā

Colivet drīkst lietot grūsnām un laktējošām sivēnmātēm.

Laboratoriskajos pētījumos pelēm, žurkām, trušiem netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība.

Mijiedarbība ar citām zālēm: Nav noteikta.