



## APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā


26.09.2024.



**Nobivac® KC** Intervet International B.V. 

nosies lašai, liofilizātas ir skiedklis suspensijai ruošti/deguna pilieni, liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai/ninatilgad, suspensiooni liofilizātā ja lahusti/Kiekvienoje (0,4 ml) atskiestos vakcinos dozēje: gyvų *Bordetella bronchiseptica*:  $\geq 10^{8.0}$  -  $\leq 10^{9.7}$  CFU, gyvo šunų paragripo:  $\geq 10^{3.0}$  -  $\leq 5.8$  TCID<sub>50</sub>. Šunys. LT/2/02/1479/001/Katra izšķīdinātās vakcīnas deva (0,4 ml): Dzīvas *Bordetella bronchiseptica*:  $\geq 10^{8.0}$  -  $\leq 10^{9.7}$  CFU, Dzīvs šunų paragripas vīruss:  $\geq 10^{3.0}$  -  $\leq 10^{5.8}$  TCID<sub>50</sub>. Supi. V/NRP/02/1487/Ūks annus (0,4 ml) manustamiskōblikuks muudetud vaktsiini: Elus *Bordetella bronchiseptica*:  $\geq 10^{8.0}$  -  $\leq 10^{9.7}$  CFU, Elus koerte paragripī vīruss:  $\geq 10^{3.0}$  -  $\leq 10^{5.8}$  TCID<sub>50</sub>. Koer. EE 1206

**5x1**  
dozē/deva/  
annust

  
Ad us. vet.

**Nobivac® KC** Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį. Saugoti nuo vaikų./Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā./Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

## Nobivac® KC

Exp.

Lot  
Exp.

909374 R2



8 713184 195555



Atskiedus sunaudoti per 1 val. Laikyti ir gabenti šaltai. Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos./Pēc pirmreizējas izšķīdināšanas izlietot 1 stundas laikā. Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas./Pārast lahustamist kasutada 1 tunni jooksul. Hoida ja transportida külmas. Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.

909765 R2