



APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

22.07.2019.

EE
Toimeaine sisaldus
 Karprofeen

50 mg/ml

Manustamisviis ja -tee(d)

 Subkutaanne või intravenoosne.
 Viaali korki ei tohi lābistada rohkem kui 20 korda.
 Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Keeluaeg

 Lihale ja sōōdavatele kudedele: 21 pāeva
 Piimale: 0 tundi

 Kōlblikkusaeg pārast vahetu pakendi esmast
 avamist: 28 pāeva.
 Pārast korgi lābistamist kasutada kuni

Sāilitamise eritingimused

 Mitte hoida kōlmkapis. Mitte lasta kōlmuda.
 Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitsult.

Hāvitamine: vt pakendi infolehte.

 Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
 Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kāttesaamatus kohas.

Mūūgiloa nr: 1767


Le Vet Beheer B.V.
 Wilgenweg 7
 3421 TV Oudewater
 Holland / NYDERLANDAI / Niderlande

LT
VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)
 50 mg/ml karprofeeno

Naudojimo būdas (-ai) ir metodos

 Švirkšti po oda arba į veną. Kamštelį pradurti
 galima ne daugiau kaip 20 kartų. Prieš naudojimą
 būtina perskaityti informacinį lapelį.

Išlauka

 Galvijienai ir subproduktams – 21 para, pienui –
 0 val.

 Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius
 pirminę pakuotę, – 28 d.
 Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki

SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

 Negalima šaldyti ar užšaldyti.
 Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas
 būtų apsaugotas nuo šviesos.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

 Tik veterinariniam naudojimui.
 Parduodama tik su veterinarinio receptu.

Saugoti nuo vaikų.

LT/2/13/2159/001


CARPRODOLOR®
 50 mg/ml

sūstelahus veistele

 injekcinis tirpalas galvijams
 šķīdums injekcijām liellopiem

Karprofeen / karprofenas / Carprofen

50 ml

LV
AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS
 Karprofēns

50 mg/ml

Lietošanas metode un ievadīšanas veids(i)

 Subkutānai vai intravenozai lietošanai.
 Aizbāzņi nedrīkst caurdurt vairāk kā 20 reizes.

 Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto
 lietošanas instrukciju.

Ierobežojumu periods

 Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.
 Pienam: nulles stundas.

 Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma
 atvēršanas: 28 dienas.
 Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot līdz

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

 Neatdzesēt vai nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā
 iepakojumā, lai pasargātu no saules gaismas.

Izņincināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

V/DCP/13/0011

 Lot:
 EXP: