

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

11.08.2020.

500 ml (1000 annust)/
(1 000 doziņ)/
(1000 devas)

SŪSTESUSPENSIOON KANADELE/
INJEKCIĒ SUSPENSĪJA VIŠTOMS/
SUSPENSĪJA INJEKCIJĀM VISTĀM

Nobilis
SALENVAC ETC

354791 R2

Nobilis
SALENVAC ETC

500 ml (1000 annust)/(1 000 doziņ)/
(1000 devas)

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

S. Enteritidis, tüvi PT4, inakt.	1-6,6 RP*
S. Typhimurium, tüvi DT104, inakt.	1-16,1 RP
S. Infantis, tüvi A, S03499-06, inakt.	1-26,6 RP

*RP (suhteline potentsus): antigense massi (ühikutes) suhe võrreldes kanadel efektiivseks tunnistatud võrdluspartii antigense massiga (ühikutes).

Intramuskulaarne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Keeluaeg: 0 päeva
Juhuslik süstimine on ohtlik. Pärast korgi läbistamist kasutada kuni 10 tunni jooksul. Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult. Hävitamine: vt pakendi infolehte. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

EE 2235

Nobilis
SALENVAC ETC

500 ml (1000 annust)/(1 000 doziņ)/
(1000 devas)

Vienoje (0,5 ml) dozėje:

S. Enteritidis, PT4 padermēs, inakt.	1 - 6,6 RP*,	+
S. Typhimurium, DT104 padermēs, inakt.	1 - 16,1 RP,	
S. Infantis, A, S03499-06 padermēs, inakt.	1 - 26,6 RP.	

*RP (santykinis imunogeniškumas): antigeninės masės santykis (vienetis) palyginus su referencinės serijos, kuri pripažinta veiksminga viščiukams, antigenine mase (vienetis)

Švirkšti į raumenis. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. Išlauka: 0 parų. Atsitiktinis įšvirkštimas yra pavojingas. Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 10 val. Laikyti šaldytuve. Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos. Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinariniuose gydytojų. Saugoti nuo vaikų.

LT/2/20/2599/001

Lot/EXP

imprint area
Varnish free

 **MSD**
Animal Health

Nobilis
SALENVAC ETC



SŪSTESUSPENSIOON KANADELE
INJEKCIĒ SUSPENSĪJA VIŠTOMS
SUSPENSĪJA INJEKCIJĀM VISTĀM

500 ml (1000 annust)/
(1 000 doziņ)/(1000 devas)

Intervet International B.V.
5831 AN Boxmeer
Holland/Nyderlandai/Niederlande

1000
 **MSD**
Animal Health

Nobilis
SALENVAC ETC

500 ml (1000 annust)/(1 000 doziņ)/
(1000 devas)

Katra deva (0,5 ml) satur:

S. Enteritidis, celms PT4, inakt.	1 - 6,6 RP*
S. Typhimurium, celms DT104, inakt.	1 - 16,1 RP
S. Infantis, celms A, S03499-06, inakt.	1 - 26,6 RP

*RP (relatīvā potence): antigēnās masas attiecība (vienībās), salīdzinot ar references sērijas antigēno masu (vienībās), kura bija uzrādījusi iedarbību vistām.

Intramuskulārai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. Ierobežojumu periods: nulle dienas. Nejauša injicēšana ir bīstama. Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 10 stundu laikā. Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas. Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

V/DCP/20/0035

PSA020S02 02 R1
82,5x82,5x156mm
C M Y K