

Nobivac RL vakcina A.U.V.



Adagonként (1 ml):

Inaktivált veszettség

Inaktivált Leptospiro

- Canicola; Ca-12

- Icterohaemorrh

Alumínium-foszfát

Szuszpenziós injek

Kutya. Inaktivált v

1 ml/állat. Subcut

Alkalmazás előtt olvassu el a használati utasítást:

2273/1/07 MgSzH ÁTI (1 adag)

Nobivac RL suspensija injekcijām suņiem. 10x1 deva **Aktīvās vielas:** Viena deva (1 ml) satur: Inakt. trakumsērgas vīruss, Pasteur RIV $\geq 0,95$ AIU, kas atbilst ≥ 3 IU Inakt. L. interrogans: Canicola, CA-12-000 ≥ 40 PD₅₀, Inakt. L. interrogans: Icterohaemorrhagiae, 820 K ≥ 40 PD₅₀. **Lietošanas metode un ievadišanas veids:** Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Nejauša injicēšana ir bīstama. Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot nekavējoties. Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas. Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšana tikai praktizējošam veterinārārstam. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! Derīgs līdz (EXP) un Sērija (Lot): skat uz iepakojuma.

Tirdzniecības atļaujas turētājs: Intervet International B.V., Nīderlande

Tirdzniecības atļaujas Nr. V/1/25/0007

Paralēli tirgots veterināro zāļu izplatītājs: SIA "Vetmarket", Eglaines iela 1, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018, Tel.: +37129999662, www.vetmarket.lv;

Veterināro zāļu pārmarkētājs:

Pārmarkēšanas sērijas Nr.: