

03. 12. 2009

MARKĒJUMS
V/NRP/05/1651

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1 x 10 ml, 6 x 10 ml, 1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PGF Veyx® forte

0.263 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Cloprostenol sodium

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

1 ml satur:

Aktīvā viela:

0.263 mg kloprostenola nātrijs, ekvivalents 0.250 mg kloprostenolam.

Palīgvielas:

1 mg hlorokrezols

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 ml

6 x 10 ml

1 x 20 ml

6 x 20 ml

1 x 50 ml

12 x 50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas

6. INDIKĀCIJAS

Liellopi:

- Meklēšanās un ovulācijas sinhronizācijai, meklēšanās sinhronizācijai dzīvniekiem ar ovulācijas ciklu, lietošanai diestrus fāzē.
- Progesterona radīta cikla blokādes gadījumā - anestrus, smags strutains dzimumorgānu iekaisums (katarāls iekaisums) vai piometra. Aborta izraisīšanai līdz 120 grūsnības dienai.
- Mumificēti augļi
- Dzemdību izraisīšanai atsevišķiem dzīvniekiem.

Cūkas:

- Dzemdību ierosināšana un sinhronizācija, sākot no 114 grūsnības dienas (1. diena = pirmā diena pēc pirmās apsēklošanas)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi:	gaļai un blakusproduktiem:	2 dienas
	pienam:	nulle dienas
Cūkas:	Gaļai un blakusproduktiem:	2 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/05/1651

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas Numurs

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

03. 12. 2009

MARKĒJUMS
V/NRP/05/1651

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PGF Veyx[®] forte
0.263 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Cloprostenol sodium

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

1 ml satur:

Aktīvā viela:

0.263 mg kloprostenola nātrijs, ekvivalents 0.250 mg kloprostenolam.

Palīgvielas:

1 mg hlorokrezols

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas

6. INDIKĀCIJAS

Liellopi:

- Meklēšanās un ovulācijas sinhronizācijai, meklēšanās sinhronizācijai dzīvniekiem ar ovulācijas ciklu, lietošanai diestrus fāzē.
- Progesterona radīta cikla blokādes gadījumā - anestrus, smags strutains dzimumorgānu iekaisums (katarāls iekaisums) vai piometra. Aborta izraisīšanai līdz 120 grūsnības dienai.
- Mumificēti augļi
- Dzemdību izraisīšanai atsevišķiem dzīvniekiem.

Cūkas:

- Dzemdību ierosināšana un sinhronizācija, sākot no 114 grūsnības dienas (1. diena = pirmā diena pēc pirmās apsēklošanas)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas
pienam: nulle dienas
Cūkas: Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/05/1651

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas Numurs:

03.12.2009

MARKĒJUMS
V/NRP/05/1651

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

10 ml, 20 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PGF Veyx® forte
0.263 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Cloprostenol sodium

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Sastāvs:
1 ml satur:
Aktīvā viela:
0.263 mg kloprostenola nātrijs, ekvivalents 0.250 mg kloprostenolam.
Palīgvielas:
1 mg hlorokrezols

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml
20 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas
 pienam: nulle dienas
Cūkas Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.