

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā
28. 08. 2009

MARKĒJUMS
V/NRP/08/1580

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa, 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis Coli 6C
Suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:

1 deva (5 ml) satur:

<i>E. coli</i> F4ab (K88 ab) antigēnu	min. 100 V;
<i>E. coli</i> F4ac (K88 ac) antigēnu	min. 100 V;
<i>E. coli</i> F5 (K99) antigēnu	min. 100 V;
<i>E. coli</i> F6 (K987P) antigēnu	min. 100 V;
<i>Clostridium perfringens</i> bēta toksoīdu (B un C tips)	min. 350 TCP vienību;
<i>Clostridium perfringens</i> epsilon toksoīdu (D tips)	min. 300 TCP vienību.

Palīgvielas:

alumīnija hidroksīds, formaldehīds, tiomersāls, ūdens injekcijām.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūka.

6. INDIKĀCIJA(S)

E. coli izraisītas caurejas un *Cl. perfringens* izraisīta nekrotiska enterīta profilaksei jaundzimušiem sivēniem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Parastā deva ir 5 ml, ko ievada subkutāni vai intramuskulāri, ieteicams, aiz auss. Pirms lietošanas pudelīti kārtīgi sakratīt.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā: Gaļai un blakusproduktiem: 0 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: {mēnesis/gads}

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmreizējas atvēršanas: tūlītējai lietošanai.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt +2–+8 °C temperatūrā (ledusskapī).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831AN Boxmeer

Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/08/1580

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons, 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**Porcilis Coli 6C**

Suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) UN DAUDZUMS**Aktīvās vielas:**

1 deva (5 ml) satur:

<i>E. coli</i> F4ab (K88 ab) antigēnu	min. 100 V;
<i>E. coli</i> F4ac (K88 ac) antigēnu	min. 100 V;
<i>E. coli</i> F5 (K99) antigēnu	min. 100 V;
<i>E. coli</i> F6 (K987P) antigēnu	min. 100 V;
<i>Clostridium perfringens</i> bēta toksoidu (B un C tips)	min. 350 TCP vienību.
<i>Clostridium perfringens</i> epsilon toksoidu (D tips)	min. 300 TCP vienību.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

i/m

s/c

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā: Gaļai un blakusproduktiem: 0 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: {mēnesis/gads}

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmreizējas atvēršanas: tūlītējai lietošanai.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.