

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

18.03.2024.

Poulvac AE liofilizāts lietošanai dzeramajā ūdenī vistām. 10 x 1000 devas. 1 deva satur: Dzīvs putnu encefalomielīta vīruss, celms Calnek, apakšcelms AE-67 103,1 – 105,5 EID50 Mērķa sugas: vistas no 10 nedēļu vecuma. Lietošanas metode un ievadīšanas veids: iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. Ierobežojumu periods: nulle dienas. Derīgs līdz un sērijas Nr.: Skat.pēc EXP un Lot. Pēc pirmreizējas sagatavošanas izlietot 2 stundu laikā. Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Sargāt no sasaldēšanas. Sargāt no gaismas. Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Zoetis Belgium SA, **Paralēli tirgto veterināro zāļu izplatītājs:** SIA Vetmarket, Tel.:+37129999662, www.vetmarket.lv

Veterināro zāļu pārmarķētājs:

Pārmarķēšanas sērijas Nr.:

Paralēli tirgto veterināro zāļu reģ. Nr.: V/I/22/0039

Poulvac® AE

Liofilizāt do sporządzenia zawiesiny do podawania w wodzie do picia. Dla kurcząt.

10 x 1000 dawek

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNY I INNYCH SUBSTANCJI

Wirus zakaznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków, szczep Calnek, podszczep AE-67: od 103,1 do 105,5 EID₅₀/dawka.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Liofilizāt do sporządzenia zawiesiny do podawania w wodzie do picia. Brażowawy proszek.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT: Kury (kurczęta do 10 tyg. życia).

WSKAZANIA LECZNICZE: Do czynnego uodporniania przyszytych kur niosek stad towarowych i stad rodzicielskich w celu zapewnienia bierniej odporności i ograniczenia pionowej transmisji wirusa zakaznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego ptaków.

SPOSÓB I DROGI PODANIA: Podanie doustne, w wodzie do picia. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Okres karencji: Zero dni.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE:

W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu szczepionkowego z zaszczepionych stad na stada niezaszczepione, wszystkie niezaszczepione ptaki obecne na fermie muszą zostać poddane szczepieniu w tym samym czasie. Nie szczepić ptaków chorych, osłabionych lub poddanych czynnikom stresowym.

Nie szczepić ptaków poniżej 10 tygodnia życia

zoetis