

08.06.2010

MARKĒJUMS
V/NRP/05/1633

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona iepakojums

10 x 2 ml (1 deva) vai 1 x 10 ml (5 devas) flakoni.

10 x 2 ml (1 deva) pilnšļirce

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Equilis Resequin suspensija injekcijām zirgiem un ponijiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 deva (2 ml) satur –

Aktīvās vielas

Inaktivēts zirgu herpes vīrusa tips 1 (EHV1), celms RAC-H $\geq 10^{7,8}$ TCID₅₀

Inaktivēts zirgu herpes vīrusa tips 4 (EHV4), celms 2252 $\geq 10^{6,5}$ TCID₅₀

Inaktivēti zirgu gripas vīrusa celmu antigēni

A/equi 1/Prāga/1/56

50 µg HA

A/equi 2/Ņūmārketa/1/93 (Amerikas tips)

20 µg HA

A/equi 2/Ņūmārketa/2/93 (Eiropas tips)

20 µg HA

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x 2 ml (1 deva) vai 1 x 10 ml (5 devas) flakoni.

10 x 2 ml (1 deva) pilnšļirce

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi un poniji.

6. INDIKĀCIJA(S)

Aktīvai zirgu un poniju imunizācijai, lai samazinātu respiratoro slimību, kuru ierosina zirgu herpes vīrusa tips 1 (EHV1), zirgu herpes vīrusa tips 4 (EHV4) un zirgu gripas (EIV) A/equi 1 un A/equi 2 patreizējie „Amerikas” un „Eiropas” vīrusu celmi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

2 ml dziļa intramuskulāra injekcija kaklā vai krūšu kurvja apvidū.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama – pirms lietošanas skatīt lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}
Pēc atvēršanas izlietot 8 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2-8°C).
Nesasaldēt.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Izplatīšanai – tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International
Wim de Köverstraat 35
5831 AN Boxmeer, Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/05/1633

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/05/1633

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons/pilnšļirce
2 ml (1 deva) vai 10 ml (5 devas) flakoni
2 ml (1 deva) pilnšļirce

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Equilis Resequin suspensija injekcijām zirgiem un ponijiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

1 deva (2 ml) satur –

Aktīvās vielas:

Inaktivēts zirgu herpes vīrusa tips 1 (EHV1), celms RAC-H	$\geq 10^{7,8}$ TCID ₅₀
Inaktivēts zirgu herpes vīrusa tips 4 (EHV4), celms 2252	$\geq 10^{6,5}$ TCID ₅₀
Inaktivēti zirgu gripas vīrusa celmu antigēni	
A/equi 1/Prāga/1/56	50 µg HA
A/equi 2/Ņūmārketa/1/93 (Amerikas tips)	20 µg HA
A/equi 2/Ņūmārketa/2/93 (Eiropas tips)	20 µg HA

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2 ml (1 deva) vai 10 ml (5 devas) flakoni.
2 ml (1 deva) pilnšļirce

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai injekcijai

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}
Pēc atvēršanas izlietot 8 stundu laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.