

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

11.09.2023.



5 x 1
annus/dozē/
deva

Nobivac® Tricat Trio



sūstesuspensiooni liofilizātā ja lahusti/liofilizātā ir šķiedrikliis injekcijai suspensijai roosti/liofilizātā un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai Kass. Subkutaanne./Katēs. s.c./Kaķi. Subkutānai lietošanai.

Annuse kohta vähemalt:/Vieno dozē ne mažiau kaip;/Vienā devā vismaz:
10^{4.6} PFU kasside kalitsivīrus, tūvi F9, 10^{5.2} PFU kasside rinotracheīdi vīrus, tūvi G2620A, 10^{4.3} CCID₅₀ kasside panleukopeenia vīrus, tūvi MW-1./10^{4.6} PFU F9 padermēs kaķu kalicivīruso, 10^{5.2} PFU G2620A padermēs kaķu rinotracheito vīruso, 10^{4.3} CCID₅₀ MW-1 padermēs kaķu panleukopenijas vīruso./10^{4.6} PFU kaķu kalici vīruss, celms F9; 10^{5.2} PFU kaķu rinotracheīta vīruss, celms G2620A; 10^{4.3} CCID₅₀ kaķu panleukopēnijas vīruss, celms MW-1.



Nobivac® Tricat Trio

Exp.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas./
Saugoti nuo vaikų./ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Intervet International B.V.
EE 1463
LT/2/07/1735/001
V/MRP/07/1709

Lot
Exp.

797212 R1



Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada 30 minuti jooksul./



Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.
Laikyti šaldytuve. Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos. Tik veterinariniam naudojimui.
Atskiedus sunaudoti per 30 min./ Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas. Lietošanai dzīvniekiem. Pēc izšķīdināšanas izlietot 30 minūšu laikā.

796507 R2