APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

03.04.2022.

Height 105mm

540 ml

altrenogestas 4,0 mg/ml;
Altrenogests 4,0 mg/ml.
Altrenogest 4,0 mg/ml.
Geriamasis tirpalas. Skaidrus, geltonas tirpalas./Šķīdums iekšķīgai lietošanai. Dzidrs, dzeltens šķīdums./Suukaudne lahus. Selge kollane lahus.

MSD Animal Health

Regumate Porcine

4 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms/šķīdums iekšķīgai lietošanai cūkām/suukaudne lahus sigadele

Lot
EXP
Imprint area

357291 R3

Width 200mm

PSB920F41 02 R1
BL: 200 x 105mm / FAF : Unfolded : 478 x 105mm
Folded : 88 x 105mm, 12 pages
C M K

BASE

Final cutter guide
Colour bleed
Maximum text area
Glue area - no print

B SIDE

Height 105mm

Regumate Porcine, 4 mg/ml **geriamasis tirpalas kiaulėms**
Altrenogestas
Veiklioji medžiaga:
altrenogestas 4,0 mg/ml;
pagalbinės medžiagos:
butilhidroksitoluenas (E321) 0,07 mg/ml,
butilhidroksianizolas (E320) 0,07 mg/ml.

Geriamasis tirpalas. Skaidrus, geltonas tirpalas.

540 ml

Kiaulaitėms rujai sinchronizuoti ir kontroliuoti lytinio ciklo metu.

Negalima naudoti kiaulių patinams. Negalima naudoti paršingoms arba infekcinėmis gimdos ligomis sergančioms kiaulėms. Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema www.vmvt.lt.

Kiaulėms (lytiškai subrendusioms kiaulaitėms).

Šio veterinarinio vaisto reikia pridėti į pašarą prieš pat šėrimą. Kiekvienam gyvūnui reikia skirti po 5 ml (20 mg altrenogesto) 18 d. iš eilės. Reikia nusukti dangtelį, ištraukti kamštį ir atmatuoti klinikinę 5 ml dozę naudojant pakuotėje esančią dozavimo taurelę, užpilti šią dozę ant pašaro ir po kiekvieno naudojimo užkimšti butelį kamščiu ir užsukti dangteliu. Būtina užtikrinti, kad visas pašaras su vaistu būtų suėstas.
Reikia užtikrinti tinkamą vaisto dozavimą, nes mažesnės nei rekomenduojama vaisto dozės gali iššaukti cistinių folikulų formavimąsi. Tuo atveju, kai pašaras su vaistu nesuėstas arba dalinai suėstas, šį pašarą reikia saugiai sunaikinti, jo negalima duoti jokiam kitam gyvūnui.

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 9 paros.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Naudoti galima tik lytiškai subrendusioms kiaulaitėms, kurios jau kartą rujojo.
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Šio veterinarinio vaisto negali naudoti *nėščios* ar galinčios būti *nėščios moterys. Vaisingo amžiaus moterys* turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Šio veterinarinio vaisto neturėtų naudoti žmonės, kuriems diagnozuoti ar įtariami su progesteronu susiję navikai arba tromboemboliniai sutrikimai.
Reikia vengti tiesioginio vaisto sąlyčio su oda. Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės (pirštinės ir kombinezonas). Porėtos pirštinės gali neapsaugoti nuo veterinarinio vaisto patekimo ant odos. Absorbcija per odą gali būti netgi didesnė, jei odos paviršius uždengtas okliuzine medžiaga, tokia kaip lateksinės ar guminės pirštinės. *Atsitiktinai patekus* ant *odos, nedelsiant reikia nuplauti muilu* ir *vandeniu*. Po naudojimo ir prieš valgį reikia plauti rankas.
Atsitiktinai patekus į akis, reikia nedelsiant *plauti* vandeniu 15 min. Reikia kreiptis į gydytoją.
Per dažno sąlyčio poveikis: pakartotinė atsitiktinė absorbcija gali sutrikdyti menstruacijų ciklą, sukelti gimdos arba pilvo spazmus, padidėjusį arba sumažėjusį kraujavimą iš gimdos, nėštumo pailgėjimą arba galvos skausmą.
Vaikingumas ar laktacija
Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Nežinoma.
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)
Nėra informacijos.
Nesuderinamumai
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.
Kitos atsargumo priemonės dėl poveikio aplinkai
Paskleidžiant gydytų gyvulių mėšlą, reikia griežtai išlaikyti minimalų atstumą iki paviršinio vandens kaip nustatyta nacionaliniuose arba vietos teisės aktuose, nes mėšle gali būti altrenogesto, kuris gali sukelti nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Regumate Porcine negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

2022-01-24

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 540 ml ir 1 l aliumininis butelis su *mažo tankio polietileno kamščiu ir užsukamu polipropileniniu dangteliu.* 540 ml ir 1 l butelių *pakuotėse yra dozavimo taurelė.* Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Tik veterinariniam naudojimui. Būtina vadovautis vaistinio premikso maišymo į pašarą oficialiais nurodymais. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Saugoti nuo vaikų.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę (butelį), – 90 d.

Registruotojas
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nyderlandai
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
Intervet Productions S.A., Rue de Lyons, 27460 Igoville, Prancūzija

LT/2/17/2384/001

Regumate Porcine 4 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai cūkām
Altrenogest
Aktīvā viela:
Altrenogests 4,0 mg/ml.
Palīgvielas:
Butilēts hidroksitoluols (E321) 0,07 mg/ml,
Butilēts hidroksianizols (E320) 0,07 mg/ml.

Šķīdums iekšķīgai lietošanai. Dzidrs, dzeltens šķīdums.

540 ml

Meklēšanās sinhronizācijai un kontrolei dzimumgatavību sasniegušām jauncūkām.

Nelietot kuiļiem. Nelietot grūsnām sivēnmātēm vai tām, kurām ir konstatēta dzemdes infekcija.
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā, kas atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē www.pvd.gov.lv.

Cūkas (dzimumgatavību sasniegušas jauncūkas).

Pievienot veterinārās zāles barībai tieši pirms barošanas. Lietot 5 ml (20 mg altrenogesta) katram dzīvniekam 18 dienas. Noskrūvēt vāciņu un izņemt aizbāzni, un nomērīt terapeitisko devu 5 ml, izmantojot pievienoto dozēšanas kausiņu, uzliet devu uz barības un pēc katras lietošanas aiztaisīt pudeli ar aizbāzni un skrūvējamo vāciņu. Nodrošināt, ka tiek uzņemta visa ar zālēm apstrādātā barība. Jānodrošina pareizās devas lietošana katru dienu, jo nepietiekama deva var izraisīt cistisku folikulu veidošanos.

Jebkādu neapēstu vai daļēji apēstu zāles saturošu barību nedrīkst dot citam dzīvniekam un tā ir jāiznīcina.

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Lietot tikai dzimumgatavību sasniegušām jauncūkām, kurām ir jau bijusi viena meklēšanās.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Sievietēm, kurām ir vai var būt iestājusies grūtniecība, nerīkoties ar šīm veterinārajām zālēm. Sievietēm reproduktīvā vecumā izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Cilvēkiem, kuri slimo ar progesterona atkarīgu audzēju (zināms vai ir aizdomas) vai kuriem ir tromboemboliski traucējumi, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Jāizvairās no tieša kontakta ar ādu. Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizmanto individuālais aizsargtērps (cimdi un kombinezoni). Poraini cimdi var laist cauri šīs veterinārās zāles. Uzsūkšanās caur ādu var būt pastiprināta, ja tās virsmu nosedz okluzīvs materiāls, piemēram, lateksa vai gumijas cimdi. Nejaušas izšļakstīšanās gadījumā uz ādas, tā nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Mazgāt rokas pēc ārstēšanas un pirms ēšanas. Gadījumā, ja notikusi nejauša saskare ar acīm, rūpīgi skalot acis ar ūdeni 15 minūtes. Meklēt medicīnisko palīdzību. Pārdozēšanas iedarbība: atkārtota nejauša uzsūkšanās var izraisīt menstruālā cikla traucējumus, dzemdes vai vēdera krampjus, pastiprinātu vai vājāku dzemdes asiņošanu, grūtniecības perioda pagarināšanos vai galvassāpes.
Grūsnība un laktācija:
Nelietot grūsnības un laktācijas laikā.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Nav zināma.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
Nav pieejami dati.
Nesaderība:
Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.
Citi piesardzības pasākumi attiecībā uz ietekmi uz vidi
Izkliedējot ārstēto dzīvnieku kūtsmēslus, ir stingri jāievēro nacionālajos tiesību aktos noteiktais minimālais attālums līdz virszemes ūdenim, jo kūtsmēsli var saturēt altrenogestu, kas varētu radīt nevēlamu iedarbību ūdens vidē.

Regumate Porcine nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

01/2022

Kartona kaste, kas satur 540 ml un 1 l alumīnija pudeles ar zema blīvuma polietilēna aizbāzni un polipropilēna skrūvējamu vāciņu. 540 ml un 1 l izmēra iepakojumiem ir pievienots dozēšanas kausiņš.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lietošanai dzīvniekiem. Jāņem vērā oficiālās vadlīnijas par ārstniecisko premiksu iekļaušanu gatavajā barībā.
Recepšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma (pudeles) atvēršanas: 90 dienas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Intervet International B.V.-Wim de Körverstraat 35-5831 AN Boxmeer-Nīderlande
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Intervet Productions S.A.-Rue de Lyons-27460 Igoville-Francija

V/DCP/17/0011

Regumate Porcine, 4 mg/ml suukaudne lahus sigadele
Altrenogest
Toimeaine:
Altrenogest 4,0 mg/ml.
Abiained:
Butüülhüdroksütolueen (E321) 0,07 mg/ml,
Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,07 mg/ml.

Suukaudne lahus. Selge kollane lahus.

540 ml

Inna sünkroonimiseks ja kontrollimiseks toimiva innatsükliga nooremistel.

Mitte kasutada kultidel. Mitte manustada tiinetele või emakapõletikuga emistele.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

Sead (suguküpsed nooremised).

Lisage veterinaarravim sööda pinnale vahetult enne söötmist. 5 ml (20 mg altrenogesti) looma kohta 18 päeva jooksul. Eemaldage keeratav kork ja sulgur ning mõõtke soovitatav annus 5 ml kaasasoleva annustamisnõu abil, valage annus söödale ning sulgege pudel sulguri ja keeratava korgiga pärast iga kasutamist. Tagage, et kogu ravimsööt ära tarbitaks. Veenduge, et iga päev manustatakse õige annus, sest alaannustamine võib põhjustada munasarjades tsüstide moodustumist. Kui ravimsööt jääb söömata või osaliselt söömata, tuleb see ohutult kõrvaldada ja seda ei tohi anda ühelegi teisele loomale.

Keeluaeg: Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kasutada ainult suguküpsetel emistel, kellel on üks ind juba olnud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Veterinaarravimit ei tohi manustada rasedad või naised, kes võivad olla rasedad. Fertiilses eas naised peavad hoiduma kokkupuutest selle veterinaarravimiga. Inimesed, kellel esineb progesteroon-sõltuvad kasvajad (teadaolevaid või eeldatavaid) või trombemboolilisi häired, ei tohi seda ravimit käsitseda. Hoiduda ravimi otsesest kokkupuutest nahaga. Veterinaaravimit käsitsedes tuleb kanda isikukaitsevahendeid (kindad ja üleriietus). Poorsed kindad võivad veterinaarravimit nahani läbi lasta. Imendumine läbi naha võib olla isegi suurem, kui piirkond on kaetud oklusiivse materjaliga, näiteks lateks- või kummikinnastega. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta kohe seebi ja veega. Pärast kasutamist ja enne söömist pesta käed. Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada põhjalikult veega 15 minuti jooksul. Pöörduda arsti poole. Ravimiga kokkupuutumisel tekkiv toime: korduv juhuslik imendumine võib põhjustada menstruaaltsükli katkemist, emaka või kõhu krampe, emaka vereerituse suurenemist või vähenemist, raseduse pikenemist või peavalu.
Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Ei ole teada.
Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
Teised keskkonnamõjuga seotud ettevaatusabinõud
Ravitud loomade sõnniku laotamisel peab rangelt kinni pidama riiklike või kohalike eeskirjadega määratud minimaalsest kaugusest pinnaveeni, sest sõnnik võib sisaldada altrenogesti, mis võib vesikeskkonnale kahjulikult mõjuda.

Regumate Porcine ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Jaanuar 2022

Pappkarp, milles on 540 ml ja 1 l alumiiniumpudel väikese tihedusega polüetüleenist sulguri ning polüpropüleenist keeratava korgiga. 540 ml ja 1 l pudeliga on kaasas annustamisnõu. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Tuleb arvestada ametlikku juhendit ravimsööda eelsegu segamiseks lõppsööda hulka. Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi (pudeli) esmast avamist: 90 päeva.

Müügiloa hoidja:
Intervet International B.V.- Wim de Körverstraat 35-5831 AN Boxmeer- Holland
Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Intervet Productions S.A.-Rue de Lyons-27460 Igoville-Prantsusmaa

EE 2027

540 ml

altrenogestas 4,0 mg/ml;
Altrenogests 4,0 mg/ml.
Altrenogest 4,0 mg/ml.
Geriamasis tirpalas. Skaidrus, geltonas tirpalas./Šķīdums iekšķīgai lietošanai. Dzidrs, dzeltens šķīdums./Suukaudne lahus. Selge kollane lahus.

MSD Animal Health

Regumate Porcine

4 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms/šķīdums iekšķīgai lietošanai cūkām/suukaudne lahus sigadele

357291 R3

A SIDE

Page 8 - 78mm | Page 9 - 78mm | Page 10 - 78mm | Page 11 - 78mm | Page 12 - 78mm | Front cover - 88mm