

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

05.06.2024.

3 X 0,5ml



5,1-10,0 kg



60 mg
tāpīlāhus
uzlāšīnāmas īs tīrpālas
šķīdums pīlīnāšanai uz ādas
roztvōr do nakraplānīa

3 X 0,5ml



5,1-10,0 kg



60 mg
tāpīlāhus
uzlāšīnāmas īs tīrpālas
šķīdums pīlīnāšanai uz ādas
roztvōr do nakraplānīa

3 X 0,5ml



5,1-10,0 kg



60 mg
tāpīlāhus
uzlāšīnāmas īs tīrpālas
šķīdums pīlīnāšanai uz ādas
roztvōr do nakraplānīa



Ainultv ēterīnārseks kasutamīseks.
Tīk vēterīnārīnīam naudojīmūi.
Lietošanai dzīvīnīekīem.
Wyłącznīe dla zwīerząt.



3 X 0,5ml



5,1-10,0 kg



60 mg
tāpīlāhus
uzlāšīnāmas īs tīrpālas
šķīdums pīlīnāšanai uz ādas
roztvōr do nakraplānīa

3 X 0,5ml



5,1-10,0 kg

3 x 0,5 ml pipete ar 0,1 ml iedaļām

1. Izvērtējiet ādas stāvokli un noteiktās vietas.

2. Izvērtējiet ādas stāvokli un noteiktās vietas.

3. Izvērtējiet ādas stāvokli un noteiktās vietas.

3 X 0,5ml



5,1-10,0 kg

3 x 0,5 ml pipete ar 0,1 ml iedaļām

1. Izvērtējiet ādas stāvokli un noteiktās vietas.

2. Izvērtējiet ādas stāvokli un noteiktās vietas.

3. Izvērtējiet ādas stāvokli un noteiktās vietas.