

Veikloji ir kit
veiklosios m
pagalbiņu m
Valsto form
Paskirties g
Indikācijas:
Biotehninē
paršivimur
kumelingu
Terapinē ir
funkcijai, n
tarprujai, p
po vakavir
vaikingum

Oestrophon 0,25 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem
Cloprostenol 10 x 1 ml. Lietošanas dzīvniekiem **Receptu veterinārās**
zāles. Aktīvā viela: Kloprostenoils (nātrija sāls veidā) 0,25 mg/ml.
Intramuskulārai lietošanai. **Ierobežojumu periods:** Liellopi, cūkas: gaļai
un blakusproduktiem: 1 diena. Liellopi: pienam: nulle dienas. Nelietot
zirgiem, kuru gaļu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. **Derīgs līdz un**
Sērijas Nr.: skat. uz iepakojuma. Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot
nekaņējoties. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas
instrukciju. Uzglabāt sausā vietā temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas.
Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem
neredzamā un nepieejamā vietā. **Reģistrācijas apliecības īpašnieks:**
Bioveta, Čehijas Republika **Paralēli importēto veterināro zāļu**
izplatītājs atļaujas īpašnieks: SIA "Vetmarket", tel.: +37129999662,
www.vetmarket.lv
Veterināro zāļu pārmarķētājs: Interchemie Werken de Adelaar EestiAS,
Igaunija. **Pārmarķēšanas sērijas Nr.:**

Nuo 10-tās dienas po gydymo HCG ar LHRH, iitkinus, kad kiaušidēs teigiamai reakcija |
vaistus), taip pat atsivedimui skatini.
Naudojimo būdai ir metodos: Karvērs ir teļoļoms vaistā reikis švirksti (raumenis arba po
gleivine (švirkšiant pusę vaisto dozės). Paršavedēms ir kumelēms vaistā reikis švirksti (|
raumenis.
Išlaika: galvijēnai, kizulēnai, arkliēnai – 24 val., pienui – 0 val.
Speciālieji īspējimai: Prieš naudojimą būtina idēmai perskaityti informacijā lapē.
Speciālais laikymo satygos: Laikyti sausoje vietoje. Žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi
būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. Saugoti nuo vaikų.