

DOXYBACTIN® vet
50 mg

EE

Üks tablett sisaldab:

Toimeaine:Doksütsükliin
(doksütsükliinhükladina) 50 mg**Manustamisviis ja -tee(d)**

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

LT

1 tableteje yra:

veikliosios medžiagos:doksiciklino
(doksiciklino hinklato) 50 mg.**Naudojimo būdas (-ai) ir metodas**

Suseriti. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Padalytų tablečių tinkamumo laikas – 3 dienas.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Saugoti nuo vaikų.

Le Vet. Behaar B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland / Nyderlanden / NederlandeMūgūlioa nr.: 2042
LT/21/172407/001
V/D/CP/17/0031

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

31.07.2019.

50
mgDOXYBACTIN®
vet
50 mg

tabletid koortele ja kassidele

tabletes šunims ir katēms

tabletes suņiem un kaķiem

*Doksütsükliin / Doksiciklinas /
Doxycycline*10
tabletti / tablečių / tabletes

Lot/Partii nr:

EXP/Kõlblik kuni:

LV

1 tablete satur:
Aktīva viela
Doksiciklīns
(doksiciklīna
hiklāta veids) 50 mg

50 mg

**Lietošanas metode un ieviešanas
veids(-i)** Iekšējai lietošanai. Pirms
lietošanas izlasiet iepakojuma pielikto
lietošanas instrukciju. Sadalītu tablešu
derīguma termiņš: 3 dienas.Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Atbilstumu
izstrādājis un izstrādājis lietošanas instrukciju.
Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterināri rās
zāles. Uzglabāt bērniem neredzams un
nepieejama vieta.