

15-06-2018



100 mg/ml
Lidor
100 ml

60885/A

Lidocaina 20 mg/ml
(como hidrocloreto de lidocaina monohidrato)

Inyección local.
Lea el prospecto antes de usar.

Después de abrir el envase primario, no conservar a temperatura superior a 25 °C. Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días. Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Eliminación: lea el prospecto.

Tiempo de espera

Caballos:
Carne: 3 días
Leche: 3 días

3623 ESP

Representante del Titular:
Laboratorios Karizoo, S.A.
Polígono Industrial La Borda
Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui, España

Lidokains (hidrochlorīda monohidrāts) 20 mg/ml

Seiņksti vietēskai.
Pirms naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Atidarius negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Pradurus kamštelį, sumaudoti per 28 dienas. Tik veterinarijai naudojimui. Parduodama tik su veterinarijos receptu. Saugoti nuo vaikų. Raškinimas: skaityti informacinį lapelį.

Išlauka:

arkliams;
skerdienai ir subproduktams – 3 paros;
pieniui – 3 paros.

LT/2/18/2444/002

100 ml

CN: 586908.7

AV

Lidor
20 mg/ml

Solución inyectable para caballos,
perros y gatos/
Inyectinis tirpalas arkliams,
šunims ir katėms/
Šķīdums injekcijām zirgiem,
suņiem un kaķiem

Lidocaina/Lidocaine



richter pharma

Lidokains (hidrochlorīda monohidrāta veids) 20 mg/ml

Lokālai injekcijai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

Pēc pirmas atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Pēc caurduršanas izlietot 28 dienu laikā. Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. Uzglabāt bērniem neredzama un nepieejama vietā. Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

Ierobežojumu periods:

Zūģiem:
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas,
Pienam: 3 dienas.

V/DCP/18/0003

Richter Pharma AG, 4020 Weiz, Austria/Austrija

GTIN: (01)9004114001510



9 004114 001411

Lot/Lote:

EXP/CAD:

