

DOXYBACTIN® vet
200 mg

EE

Üks tablett sisaldab:

Toimeaine:Doksütsükliin
(doksütsükliinhüklaadina) 200 mg**Manustamisviis ja -tee(d)**

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

LT

1 tableteje yra:

veikliosios medžiagos:doksiciklino
(doksiciklino hiklato) 200 mg.**Naudojimo būdas (-ai) ir metodas**

Sušerti. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Padalytų tablečių tinkamumo laikas – 3 dienas.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinarijoms naudojami.
Parduodama tik su veterinarijiniu receptu.

Saugoti nuo vaikų.

Le Vet, Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland / Nijverland / NederlandeMūgūlioa nr.: 2043
LT/21/17/2408/001
V/D/CP/17/0032

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārājā dienestā

31.07.2019.

200
mgDOXYBACTIN®
vet
200 mg

tabletīd koertele

tabletēs šunims

tabletes suņiem

*Doksütsükliin / Doksiciklinas /
Doxycycline*

10

tableti / tablečių / tabletes

Lot/Partii nr:

EXP/Kõlblikk kuni:

LV

1 tablete satur:
AktīvāvielaDoksiciklīns (doksiciklīna
hiklāta veidā) 200 mg**Lietošanas metode un ievadīšanas
veids(-i)** Iekšējai lietošanai. Pirms
lietošanas izlasiet iepakojuma pievienoto
lietošanas instrukciju. Sadaļtu tablešu
derīguma termiņš: 3 dienas.Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Atkārtumu
iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.
Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterināriņās
zāles. Uzglabāt bērniem neredzams un
nepieejama vieta.