

**MARKĒJUMS**  
**V/NRP/03/1583**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**Flakons, 1000 ml**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Baycox 5% oral suspension**

50 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai cūkām

*Toltrazuril*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

**Aktīvā vielas**

1 ml satur :

Toltrazurils 50 mg

**Papildvielas:**

Nātrijs benzoāts (E211) 2,1 mg

Nātrijs propionāts (E281) 2,1 mg

**3. ZĀĻU FORMA**

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

100 ml

250 ml

1000 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Cūkas (sivēni, 3 – 5 dienas veci)

**6. INDIKĀCIJAS**

Kokcidiozes profilaksei un klīnisko pazīmju ārstēšanai jaundzimušiem sivēniem (3 – 5 dienas veciem) un fermās ar apstiprinātu kokcidiozi, ko izraisījusi *Isoospora suis* invāzija

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļa un blakusprodukti: 77 dienas

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Nav zināmi

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz(mēnesis/gads):

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

-

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem  
Recepšu veterinārās zāles

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Bayer HealthCare AG,  
51368 Leverkusen,  
Vācija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/03/1583

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija (numurs):