

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

20.05.2024.

Nobilis® ND C2

liofilizātas akū ir nosies suspensijai ruošīti
liofilizāts okulonazālas suspensijas pagatavošanai
okulonasaalsuspensiooni liofilizāat

2 500

12 x 2 500 doziņ/devas/annust



sphereon®

Gyvas nusilpnintas C2 padermēs Niukaslo ligos virusas (NDV): 5,7-7,5 log₁₀ EID₅₀* /dozēje. *EID₅₀: 50% embrionu užkreāanti dozē. Vištos. Naudojimas ī akī ar šnervē (isk. purškimā). Islauka: 0 parū. Atskiedus sunaudoti per 3 val. Prieš naudojimā perskaityti pakuotēs lapelī. Tik veterināriņiam naudojimui. Saugoti nuo vaikū. LT/2/05/1684/014

Dzīvs, novājināts Nūkāsas slimības vīruss (NDV), celms C2: 5,7-7,5 log₁₀ EID₅₀* /devā. *EID₅₀: 50% embrijus inficējoša deva. Vistas. Okulonazālai lietošanai (ieskaitot izsmidzināšanu). Ierobežojumu periods: nulle dienas. Pēc pirmreizējas izšķidrināšanas izlietot 3 stundu laikā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai dzīvniekiem. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. V/MRP/05/1645

Newcastle'ī haiguse nōrģestatud elusvīruse (NDV) tūvi C2: 5,7-7,5 log₁₀ EID₅₀* annuse kohta. *EID₅₀: 50% embrūoid nakatav annus. Kana. Okulonasaalne (sh pihus). Keeluaeg: 0 pāeva. Pārst manustamiskāiblikuks muutmist kasutada 3 tunni jooksul. Enne ravimi kasutamist lugeje pakendi infolehte. Ainult veterināarseks kasutamiseks. Hoida lastē eest varjatud ja kāttsaamatus kohas. EE 1301

Intervet International B.V.



MSD
Animal Health

sphereon®
Nobilis® **ND C2**

2 500

12 x 2 500 dozių/devas/annust

Lot

Exp.

Nobilis® **ND C2**

2 500

12 x 2 500
dozių/devas/annust

Laikyti šaldytuve. Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos.
Atskiedus laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.
Pēc izšķīdināšanas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist hoida temperatuuril kuni 25 °C.



sphereon®



MSD
Animal Health

215533 R2

