

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

26.04.2024.



PROCAPEN INJECTOR 3 g

intramammaarsuspensioon veistele

*Benzylpenicillinum procainum
monohydricum*

suspensija ievadīšanai tesmenī

*liellopiem Benzylpenicillinum
procainum*

intramaminē suspensija galvijams

Benzylpenicillinum procainum

EE Toimeaine kogus: Prokaiinbensūlpenitsilliinmonohidraat 3,0 g (vastab 1,7 g bensūlpenitsilliinile) **Keeluaeg:** **Lihale ja sēdāvatēle kudele:** 5 pāeva ; piimale: 6 pāeva. **Pōhjalikult loksutāda. Ainult veterināarseks kasutamiseks.**

LV Aktīvās vielas daudzums: Benzilpenicilīns, prokāina monohidrāts 3,0 g (atbilst 1,7 g benzilpenicilīna) **Ierobežojumu periods:** Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas Pienam: 6 dienas, **Saskalināt! Lietošānai dzīvniekiem.**

LT Veikliosios medžiagos kiekis: Benzilpenicilino prokaino monohidrato 3 g (atitinka 1,7 g benzilpenicilino). **Išlauka:** galvijienai ir subproduktams – 5 paros ; pienui – 6 paros. **Suplakti. Tik veterināriniam naudojimui.**

10 ml

Lot: } Vaata kolvilt
EXP: } Nurodyta ant stūmoklio
Skat virzuli

04.042.1804

1804