

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0023

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba, 4 g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil

50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem un cūkām.
Ceftiofur (as ceftiofur sodium)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs flakons satur 4g ceftiofūra (kā nātrija sāls) pulveri.
Katrs šķīdinātāja flakons satur 80 ml Injekciju ūdens.
Katrs ml gatava šķīdinājuma satur 50 mg ceftiofūra.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

4 g pulvera flakons [100 ml]
80 ml šķīdinātāja flakons [100 ml]

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas.

6. INDIKĀCIJAS

Bakteriālas izcelsmes elpošanas ceļu slimības ārstēšanai liellopiem un cūkām. Starppirkstu nekrobacilozes (nagu puve) ārstēšanai liellopiem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Tikai intramuskulārai ievadīšanai.

Šķīdināšana

4g flakons: šķīdināt pievienojot 80 ml injekciju ūdens.

Lai atvieglotu šķīdināšanu lietot 18G adatu. Strauja šķīdinātāja pievienošana dod labāku rezultātu.

Devas liellopiem un cūkām.

Mērķa sugas	Devas	Devas šķīdinājumam	Indikācijas	Lietošanas biežums
Liellopi	1 mg/kg	1ml/50kg	Elpošanas ceļu slimības	Vienreiz dienā ar 24 stundu intervālu 3-5 dienas
			Nagu puve	Vienreiz dienā

				ar 24 stundu intervālu 3 dienas
Cūkas	3 mg/kg	1ml/16kg	Elpošanas ceļu slimības	Vienreiz dienā ar 24 stundu intervālu 3 dienas

Neievadīt vairāk kā 10 ml vienā injekcijas vietā.

Ievadīšana

Liellopiem un cūkām jāievada tikai intramuskulāri. Cūkām jāizvairās no injekcijas taukaudos. Injicējot jāievēro aseptika.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.
Pienam: nulle dienas.

Cūkas Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Brīdinājums: Penicilīni/cefalosporīni dažkārt var būt par cēloni smagām alerģiskām reakcijām.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Atvērtu izlietot līdz.....

Veterināro zāļu derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas: 24 stundas uzglabājot ledusskapī (2-8°C).

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizšķīdinātu produktu un šķīdinātāju uzglabāt ledusskapī (2-8°C)..

Pēc izšķīdināšanas produktu var uzglabāt ledusskapī (2-8°C) ne ilgāk kā 24 stundas.

Jebkurš izšķīdināts produkts pēc noteiktā perioda jābrāķē.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām .

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:

Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co Down
Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/DCP/09/0023

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

21. 04. 2010

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0023

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons, 4g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil

50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem un cūkām.

Ceftiofur (as ceftiofur sodium)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs flakons satur 4g ceftiofūra (kā nātrija sāls) pulveri, kuru jāizšķīdina 80 ml Injekciju ūdens.

Katrs ml gatava šķīdinājuma satur 50 mg ceftiofūra.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

4 g (100 ml flakons)

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas.

6. INDIKĀCIJAS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Tikai intramuskulārai ievadīšanai liellopiem un cūkām.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

Liellopi Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Pienam: nulle dienas.

Cūkas Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret ceftiofūru.

Brīdinājums: Penicilīni/cefalosporīni dažkārt var būt par cēloni smagām alerģiskām reakcijām.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Atvērtu izlietot līdz.....

Veterināro zāļu derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas: 24 stundas uzglabājot ledusskapī (2-8°C).

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizšķīdinātu produktu un šķīdinātāju uzglabāt ledusskapī (2-8°C)..

Pēc izšķīdināšanas produktu var uzglabāt ledusskapī (2-8°C) ne ilgāk kā 24 stundas.

Jebkurš izšķīdināts produkts pēc noteiktā perioda jābrāķē.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām .

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:

Norbrook Laboratories Limited

Newry

Co Down

Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/DCP/09/0023

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

21. 04. 2010

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0023

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons šķīdinātājam, 80 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ūdens Cefenil 50 mg/ml pulvera izšķīdināšanai injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Produkts satur 100% m/m Injekciju ūdens.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdinātājs parenterālai ievadīšanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

80 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas.

6. INDIKĀCIJAS

Injekciju ūdens, kas paredzēts lietot kā sterīlu šķīdinātāju Cefenil Sterile Powder izšķīdināšanai parenterālai lietošanai.

Pirms lietošanas skatīt Cefenil iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Šķīdinātājs Cefenil 50 mg/ml pulvera izšķīdināšanai, injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.

Intramuskulārai ievadīšanai liellopiem un cūkām.

Pirms lietošanas skatīt Cefenil iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

Pirms lietošanas skatīt Cefenil iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt Cefenil iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2-8°C)..

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām .

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co Down
Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/DCP/09/0023

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs: