

Pharmasin 500 WSP

500 mg/g ūdent šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cukām, liellopiem, vistām un itariem

Tyosin

1000 g

SASTAVS:1 g pulvera satur: Tiložīns(tiložīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.

ZĀLU FORMA: Ūdent šķīstošs pulveris.

MĒRKA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broļieri), vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), itari.

INDIKĀCIJAS: Pret tiložīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas sīmbu (mikoplazmozes, infekcioza snovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un itariem; infekciozs sinusīts itariem; dizentērija un enzoosiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS

IZMANTOSĀNA Gaļai: Vistām - 1 diena, itariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.

Azīlēts lietojot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

IPĀŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumā

pievienoto lietošanas instrukciju.

IPĀŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.

Glabāt sausa vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Jekkkuras veterīnārās zāles vai to akritūmi jāzīnčīna saskaņā ar vieļoju normatīvo aktu prasībām bīstamiem akritūmiem. Lietošānai dzīvniekiem. Receptšu veterīnārās zāles. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

REGISTRĀCIJAS APĻIECĪBAS IPĀSNIEKA

Huvepharma NV, Utbredingsstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija

Reģ.apl.numurs:

Derfīgs līdz (mēnesis/gads) Sērija (numurs)

Pharmasin 500 WSP

500 mg/g ūdent šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cukām, liellopiem, vistām un itariem

Tyosin

1000 g

SASTAVS:1 g pulvera satur: Tiložīns(tiložīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.

ZĀLU FORMA: Ūdent šķīstošs pulveris.

MĒRKA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broļieri), vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), itari.

INDIKĀCIJAS: Pret tiložīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas sīmbu (mikoplazmozes, infekcioza snovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un itariem; infekciozs sinusīts itariem; dizentērija un enzoosiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS

IZMANTOSĀNA Gaļai: Vistām - 1 diena, itariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.

Azīlēgs lietojot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

IPĀŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumā

pievienoto lietošanas instrukciju.

IPĀŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.

Glabāt sausa vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Jekkkuras veterīnārās zāles vai to akritūmi jāzīnčīna saskaņā ar vieļoju normatīvo aktu prasībām bīstamiem akritūmiem. Lietošānai dzīvniekiem. Receptšu veterīnārās zāles. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

REGISTRĀCIJAS APĻIECĪBAS IPĀSNIEKA

Huvepharma NV, Utbredingsstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija

Reģ.apl.numurs:

Derfīgs līdz (mēnesis/gads) Sērija (numurs)

Pharmasin 500 WSP

500 mg/g ūdent šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cukām, liellopiem, vistām un itariem

Tyosin

1000 g

SASTAVS:1 g pulvera satur: Tiložīns(tiložīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.

ZĀLU FORMA: Ūdent šķīstošs pulveris.

MĒRKA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broļieri), vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), itari.

INDIKĀCIJAS: Pret tiložīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas sīmbu (mikoplazmozes, infekcioza snovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un itariem; infekciozs sinusīts itariem; dizentērija un enzoosiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS

IZMANTOSĀNA Gaļai: Vistām - 1 diena, itariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.

Azīlēgs lietojot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

IPĀŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumā

pievienoto lietošanas instrukciju.

IPĀŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.

Glabāt sausa vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Jekkkuras veterīnārās zāles vai to akritūmi jāzīnčīna saskaņā ar vieļoju normatīvo aktu prasībām bīstamiem akritūmiem. Lietošānai dzīvniekiem. Receptšu veterīnārās zāles. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

REGISTRĀCIJAS APĻIECĪBAS IPĀSNIEKA

Huvepharma NV, Utbredingsstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija

Reģ.apl.numurs:

Derfīgs līdz (mēnesis/gads) Sērija (numurs)

Pharmasin 500 WSP

500 mg/g ūdent šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cukām, liellopiem, vistām un itariem

Tyosin

1000 g

SASTAVS:1 g pulvera satur: Tiložīns(tiložīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.

ZĀLU FORMA: Ūdent šķīstošs pulveris.

MĒRKA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broļieri), vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), itari.

INDIKĀCIJAS: Pret tiložīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas sīmbu (mikoplazmozes, infekcioza snovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un itariem; infekciozs sinusīts itariem; dizentērija un enzoosiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS

IZMANTOSĀNA Gaļai: Vistām - 1 diena, itariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.

Azīlēgs lietojot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

IPĀŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumā

pievienoto lietošanas instrukciju.

IPĀŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.

Glabāt sausa vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Jekkkuras veterīnārās zāles vai to akritūmi jāzīnčīna saskaņā ar vieļoju normatīvo aktu prasībām bīstamiem akritūmiem. Lietošānai dzīvniekiem. Receptšu veterīnārās zāles. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

REGISTRĀCIJAS APĻIECĪBAS IPĀSNIEKA

Huvepharma NV, Utbredingsstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija

Reģ.apl.numurs:

Derfīgs līdz (mēnesis/gads) Sērija (numurs)

Pharmasin 500 WSP

500 mg/g ūdent šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cukām, liellopiem, vistām un itariem

Tyosin

1000 g

SASTAVS:1 g pulvera satur: Tiložīns(tiložīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.

ZĀLU FORMA: Ūdent šķīstošs pulveris.

MĒRKA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broļieri), vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), itari.

INDIKĀCIJAS: Pret tiložīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas sīmbu (mikoplazmozes, infekcioza snovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un itariem; infekciozs sinusīts itariem; dizentērija un enzoosiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS

IZMANTOSĀNA Gaļai: Vistām - 1 diena, itariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.

Azīlēgs lietojot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

IPĀŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumā

pievienoto lietošanas instrukciju.

IPĀŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.

Glabāt sausa vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Jekkkuras veterīnārās zāles vai to akritūmi jāzīnčīna saskaņā ar vieļoju normatīvo aktu prasībām bīstamiem akritūmiem. Lietošānai dzīvniekiem. Receptšu veterīnārās zāles. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

REGISTRĀCIJAS APĻIECĪBAS IPĀSNIEKA

Huvepharma NV, Utbredingsstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija

Reģ.apl.numurs:

Derfīgs līdz (mēnesis/gads) Sērija (numurs)

Pharmasin 500 WSP

500 mg/g ūdent šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cukām, liellopiem, vistām un itariem

Tyosin

1000 g

SASTAVS:1 g pulvera satur: Tiložīns(tiložīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.

ZĀLU FORMA: Ūdent šķīstošs pulveris.

MĒRKA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broļieri), vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), itari.

INDIKĀCIJAS: Pret tiložīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas sīmbu (mikoplazmozes, infekcioza snovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un itariem; infekciozs sinusīts itariem; dizentērija un enzoosiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS

IZMANTOSĀNA Gaļai: Vistām - 1 diena, itariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.

Azīlēgs lietojot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

IPĀŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumā

pievienoto lietošanas instrukciju.

IPĀŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.

Glabāt sausa vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Jekkkuras veterīnārās zāles vai to akritūmi jāzīnčīna saskaņā ar vieļoju normatīvo aktu prasībām bīstamiem akritūmiem. Lietošānai dzīvniekiem. Receptšu veterīnārās zāles. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

REGISTRĀCIJAS APĻIECĪBAS IPĀSNIEKA

Huvepharma NV, Utbredingsstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija

Reģ.apl.numurs:

Derfīgs līdz (mēnesis/gads) Sērija (numurs)