

155,00 mm

EE
 Üks ml sisaldab:
 Toimeaine:
 Prokaiinbensüülpenitsilliin 300 mg
 (vastab 175,8 mg bensüülpenitsilliinile)
 Abiaine: metüülparahüdroksibensoaat
 E218 2,0 mg
 Ainult intramuskulaarseks
 kasutamiseks.
 Enne ravimi kasutamist lugege pakendi
 infolehte.
 Keeluaeg:
 Veised: Lihale ja söödavatele kudedele:
 10 päeva.
 Piimale: 108 tundi (4,5 päeva).
 Sead: Lihale ja söödavatele kudedele: 7
 päeva.
 Lambad: Lihale ja söödavatele
 kudedele: 4 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks lammastele,
 kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad
 mõnikord põhjustada raskeid allergilisi
 reaktsioone. Lugege hoiatusi pakendi
 infolehel.
 Kõlblikusaeg pärast esmast avamist:
 28 päeva. Pärast avamist kasutada
 kuni:
 Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
 Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
 Retseptiravim.
 Müügiloa nr: 2291

Lot:
 EXP:

LV
 Katrs ml satur:
 Aktīvā viela:
 benzilpenicilīna prokaīna sāls
 300 mg
 (atbilst 175,8 mg benzilpenicilīna)
 Palīgvielas: metilparahidroksibenzoāts
 E218 2,0 mg
 Tikai intramuskulārai
 lietošanai.
 Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam

Varnish free area

APSTIPRINĀTS
 Pārtikas un veterinārajā dienestā
 19.08.2021.

P1; FRONT (TOP LAYER)

NEUTRALIZATION + RELEASE VARNISH
 Glue Side

P2; FRONT (GLUE SIDE)
 NEUTRALIZATION + REL

14,00 mm

5,00 mm

pievienoto lietošanas instrukciju.
 Liellopiem:
 Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas. Pienam:
 108 stundas (4,5 dienas).
 Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.
 Aitām: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.
 Nav reģistrēts lietošanai aitām, kuru pienu
 paredzēts izmantot cilvēku uzturā.
 Reizēm penicilīni un cefalosporīni var izraisīt
 nopietnas alerģiskas reakcijas. Skatīt informāciju
 lietošanas instrukcijā, sadaļā "Ipaši piesardzības
 pasākumi lietošanā".
 Derīguma termiņš pēc pirmreizējas flakona
 caurduršanas: 28 dienas. Pēc pirmreizējas
 caurduršanas, izlietot līdz:
 Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).
 Lietošanai dzīvniekiem.
 Receptu veterinārās zāles.
 V/DCP/21/0035

LT
 Kiekvienam ml yra:
 veikliosios medžiagos:
 benzilpenicilino prokaīno 300 mg,
 (atitinka 175,8 mg benzilpenicilino);
 pagalbinės medžiagos: metilo
 parahidroksibenzoato
 E218 2,0 mg.
 Švirkšti tik į raumenis.
 Prieš naudojant būtina perskaityti informaciją
 lapelį.
 Išlauka:
 Galvijai: Skerdienai ir subproduktams - 10 parų.
 Pienui - 108 val. (4,5 paros).
 Kiaulės: Skerdienai ir subproduktams - 7 paros.
 Avys: Skerdienai ir subproduktams - 4 paros.
 Neregistruotas naudoti avims, kurių pienas
 skirtas žmonių maistui.
 Penicilinai ir cefalosporinai kartais gali sukelti

sunkias alergines reakcijas. Naudojimo
 išpėjimus žr. informaciniame lapelyje.
 Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius
 flakoną: 28 paros. Atidarius sunaudoti iki:

 Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C).
 Tik veterinarijam naudojimui. Parduoama
 tik su veterinariu receptu.
 LT/2/21/2658/001

Bimeda Animal Health Limited
 2, 3 & 4 Airton Close
 Airton Road
 Tallaght
 Dublin 24
 Iirimaa/ Irinja/ Airija

P3; FRONT (BOTTOM LAYER)