

APSTIPRINĀTS
Pārtikas un veterinārajā dienestā
09.01.2020.



gels ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm
750 mg
4 injektori
Lincomycin

Linkidrum



00.00.00.00



Linkidrum

750 mg

gels ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

4 injektori

Lincomycin

Viens injektors (5 g) satur:
Aktīvā viela: 750 mg linkomicīna (atbilst 850 mg linkomicīna hidrohlorīda).
MĒRĶA SUGAS: Liellopi (laktējošas govīs).
LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS
Lietošanai tesmenī.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
IEROBEŽOJUMU PERIODS
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.
Pienam: 84 stundas (7 slaukšanas reizes).
ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas izlietot nekavējoties.



Linkidrum

750 mg

gels ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

4 injektori

Lincomycin

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
Šim veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI
Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
V/NRP/15/0018

Reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese
FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia
Bologna, Itālija



Sērija

Derīgs līdz

