Pharmasin 500 WSP
500 mg/g ūdenī šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām, liellopiem, vistām un tītariem
Tylosin
100 g
SASTĀVS:1 g pulvera satur: Tilozīns(tilozīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.
ZĀĻU FORMA: Ūdenī šķīstošs pulveris.
MĒRĶA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broileri, vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), tītari.
INDIKĀCIJAS: Pret tilozīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas slimību (mikoplazmozes, infekcioza sinovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un tītariem; infekciozs sinusīts tītariem; dizentērija un enzootiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.
LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
I**EROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJUAS IZMANTOŠANĀ** Gaļai: Vistām - 1 diena, tītariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.
Aizliegts lietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.
ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.
Glabāt sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.
Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA
Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija
Reģ.apl.numurs:
Derīgs līdz {mēnesis/gads} Sērija {numurs}

Pharmasin 500 WSP
500 mg/g ūdenī šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām, liellopiem, vistām un tītariem
Tylosin
100 g
SASTĀVS:1 g pulvera satur: Tilozīns(tilozīna tartarāta formā) 500 mg; **Palīgvielas:**Laktozes monohidrāts.
ZĀĻU FORMA: Ūdenī šķīstošs pulveris.
MĒRĶA SUGAS: Cūkas, liellopi(teļi), vistas (broileri, vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), tītari.
INDIKĀCIJAS: Pret tilozīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas slimību (mikoplazmozes, infekcioza sinovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un tītariem; infekciozs sinusīts tītariem; dizentērija un enzootiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija teļiem.
LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS: Perorāli, kopā ar dzeramo ūdeni.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
I**EROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJUAS IZMANTOŠANĀ** Gaļai: Vistām - 1 diena, tītariem - 5 dienas, cūkām - 2 dienas, teļiem - 14 dienas.
Aizliegts lietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.
ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Turēt iepakojumu cieši aizvērtu.
Glabāt sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.
Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA
Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, B-2600 Berchen, Antwerpen, Beļģija
Reģ.apl.numurs:
Derīgs līdz {mēnesis/gads} Sērija {numurs}