

100 ml šķiduma satur:

Aktīvās vielas:
Kalcija glikonāts 24,0 g
(atbilst Ca^{2+} : 2,15g vai 54 mmol)
Magnija hlorīds, 6 H₂O 6,0 g
(atbilst Mg^{2+} : 0,72g vai 30 mmol)
Borskābe 6,0 g
Šķīdums nesatur endotoksīnus.
Stiprs hipertonišķs šķīdums.

Zāļu forma

Šķīdums infūzijām.
Dzirds, bezkrāsains līdz viegli
ledzeliens šķīdums.

Indikācija(-s)

Zirgliem, liellopiem, aitām,
kazām, cūkām:
akūta hipokalcēmija
kā papild līdzeklis alerģijas,
anafilakses, hemorāģisko
diatēžu gadījumā.

Kontraindikācijas

Nelietot sekojošos gadījumos:
- hiperkalciēmija un
hipermagnēmija,
- idiopātiska hipokalcēmija
kūmeļiem,
- kalcinoze liellopiem un
mazajiem aģremolājiem,
- septiēmija akūta masīta
gadījumā liellopiem,
- pēc lielu D₂ vitamīna devu
lietošanas.

C-B-Gluconat 24% plus 6%

šķīdums infūzijām zirgliem,
liellopiem, aitām, kazām,
cūkām

Calcium gluconate/
Magnesium chloride/
Boric Acid

Reģistrācijas apliecības prasniēks:

SIA „Bebra Serviss”
„Doktorāts” Bebrenes pagasts
Ilokses novads
LV-5439, Latvija

Par sērijas izlaidi atbildīgais

ražotājs:
Bela-Pharm GmbH & Co. KG,
Löhner Str. 19,
49377 Vechta, Vācija



bela-pharm GmbH & Co. KG
Löhner Strabe 19 · D-49377 Vechta

05/18 E1585154LVL

Sērija:

Derīgs līdz:

- hroniska nīru nepietiekamība,
- vienlaikus vai uzreiz pēc
neorganisko šķīdumu
ievadīšanas.

Nelietot gadījumos, ja
konstatēta pastiprināta jutība
pret aktīvajām vielām vai pret
kādu no palīgvielām.

Iespējams blakusparādības

Kalcijs pat, ja lietois tikai
terapeitiskās devās, var izraisīt
pārejošu hiperkalciēmiju ar
šādiem simptomiem:
- sākotnēja bradīkardija,
- nemiers, muskuļu trīce,
slēkalošanās,
- pātrināta elpošana.
Novēlotas blakusparādības
var izpausies kā traucējumi
vispārējā veselības stāvokļa
traucējumi un hiperkalciēmijas
simptomi 6 – 10 stundas pēc
zāļu lietošanas, bet tie nav
jādiagnostice kā atkārtota
hipokalcēmija.



4 044565 1006813

500 ml

Ja novērojāt jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu
iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā,
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

Mērķa sugas

Zirgli, liellopi, aitas, kazas, cūkas.

Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes

Lēnām intravenozām infūzijām.

- Liellopi:

akūtas hipokalcēmijas gadījumos:
40-50 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% / 50 kg ķermeņa svara
(atbilst 0,43 – 0,54 mmol Ca^{2+} un
0,24 – 0,30 mmol Mg^{2+} / kg ķermeņa svara).
kā papildlīdzeklis alerģiju, anafilakses, hemorāģiskās,
diatēzes gadījumā:
25-30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% / 50 kg ķermeņa svara
(atbilst 0,27 - 0,32 mmol Ca^{2+} un
0,15 - 0,18 mmol Mg^{2+} / ķermeņa svara).

- Zirgli, teļi, aitas, kazas, cūkas:

30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% / 50 kg ķermeņa svara
(atbilst 0,32 mmol Ca^{2+} un
0,18 mmol Mg^{2+} / ķermeņa svara).

Atkārtoti ievadīt ne ātrāk kā 6 stundas pēc pirmreizējās
lietošanas. Ja esošie hipokalcēmijas simptomi neizzūd, var
veikt papildus infūzijas ar 24 stundu intervālu.

Ieteikumi parerzai lietošanai

Intravenozā infūzija jāveic lēnām 20 – 30 minūšu laikā,
Devu nozādes ir dotas kā vadlīnijas un ir jāņemērto
individuālajam kalcija deficītam un esošajam asinsrites
sistēmas stāvoklim.

Hiperkalciēmijas simptomi var
būt novēroti 6 – 10 stundas
pēc zāļu lietošanas un tie nav
jādiagnostice kā atkārtota
hipokalcēmija līdzīgu
simptomu dēļ.

Nesaderība:

Ta kā nav veikti saderības
pētījumi, šīs veterinārās zāles
nedrīkst lietot maisījumā ar
citām veterinārajām zālēm,
hipokalcēmija līdzīgu
simptomu dēļ.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to

atkritumu iznīcināšanai
Jebkuras neizlietotas
veterinārās zāles vai to
akriturni jāiznīcina saskaņā ar
nacionālajiem tiesību aktiem.

**Datums, kad lietošanas
instrukcija pēdējo reizi tika
apsitiprināta**
03/2017

Cita informācija

Flakona tilpums 500 ml,
kas iepakots kartona kastē pa
1, 6 vai 12 flakoniem.
Ne visi iepakojuma izmēri var
tikti izplatīti.

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

Īpaši uzglabāšanas norādījumi

Uzglabāt temperatūrā ne zemāka kā 8 °C. Lietot tikai dzirdru
šķīdumu, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Īpaši brīdinājumi

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Intravenozā infūzija jāveic lēnām.

Infūzijas laikā jākontrolē sirdsdarbība un asinsrite.

Ja parādās pārdozēšanas pazīmes (sirds ritma traucējumi,
asinsspiediena samazināšanās, nemiers), infūzija
nekavējoties jāpārtrauc.

Grūdsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūdsnības,
laktācijas laikā.

Miliedarbība ar citām zālēm un citu miliedarbības veidi:

Kalcijs pastiprina sirds glikozīdu iedarību.

Kalcijs pastiprina β-adrenerģisko vielu un meliksanīnu
iedarbību uz sirdi.

Glikokortikoidi kā D vitamīna antagonisti, pastiprina kalcija
izdalīšanos caur nierēm.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Parāk strauja ievadīšana vai pārdozēšana var izraisīt
hiperkalcēmiju vai hipermagnēmiju ar kardiotoxiskiem
simptomiem, tādēļ kā sākotnējā bradīkardija ar sekojošu
tahikardiju, sirds ritma traucējumi, smagos gadījumos
ar ventrikulāra fibrilācija. Citi hiperkalciēmija simptomi ir
muskuļu vājums, muskuļu trīce, pastiprināta uzbudināmība,
nemiers, svīšana, polidūrija, pazemināts asinsspiediens,
depresija, kā arī koma.

Maksimālā infūzijas līmeņa pārsniegšana histamīna
izdalīšanās dēļ, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Šādos gadījumos infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Lietošanai dzīvniekiem.

Receptu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā
iepakojuma atvēršanas:

Neizlietotais šķiduma daudzums
jāiznīcina.

V/NRP/14/0004