

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

26.04.2023.

1240/002

Revertor[®]
5 mg/ml



Revertor[®]
5 mg/ml

**Injekcinis šķīdums
šunim un kaķim**

Atipamezoli hydrochloridum

10 ml

cp pharma

LT

1 ml injekcinio šķīduma satur:
veiksmīgās medžiagas: atipamezoli
hidrochlorīdu 5 mg;
palīgvielas: metilparahidroksibenzoāts
[E 218] 1 mg, nātrija hlorīds, vandeniņo hlorīdu
rūgštes, nātrija hidroksīdu, injekcinio vandens.

Atipamezoli hidrochlorīds ir selektīvs
α2-antagonists, skīrtas šūnīm ir katēms
sedatīviņam medetomidīno ar deksmedetomidī-
no poveikui panaikint.

Priēš naudojimą būtina įdēmiai perskaityti
informacijā lapelį. Švirkšti į raumenis vieną kartą.
Vaistą reikia švirkšti praėjus 15–60 min. po
medetomidīno hidrochlorīdu ar deksmedetomidī-
no hidrochlorīdu švirkštimo. Atsibudimo laikas
sutrumpėja iki maždaug 5 min. Panaudojus
preparatą, gyvūnas tampa jūdrus po maždaug
10 min.

Laikyti originalioje kartoninėje dėžutėje. Saugoti
nuo šviesos. Tinkamo laikas, atidarius pirmą
pakuotę, – 28 d. Saugoti nuo vaikų.

Atidarius būtina sunaudoti iki

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su
susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama tik veterinariniuose gydytojų.

LT/2/07/1771/001

LV

1 ml šķīduma injekcijām satur:
Aktīvā viela: atipamezola hidrochlorīds 5 mg
Palīgvielas: metil-para-hidroksibenzoāts [E218]
1 mg. Nātrija hlorīds, sālskābe, nātrija hidroksīds
un ūdens injekcijām.

Atipamezola hidrochlorīds ir selektīvs α2-antagonists un ir indicēts medetomidīna un deksmedetomidīna sedatīvās iedarbības atcelšanai suņiem un kaķiem.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju. Vienai intramuskulārai injekcijai. Atipamezola hidrochlorīds tiek ievadīts 15-60 minūtes pēc medetomidīna vai deksmedetomidīna hidrochlorīda ievadīšanas. Atgūšanās laiks tiek saīsināts līdz apmēram

5 minūtem. Dzīvnieks atgūst kustību spēju apmēram 10 minūšu laikā pēc zāļu ievadīšanas.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā. Sargāt no gaismas. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Pēc atvēršanas izlietot līdz.....

Jebkuras neizlietotās veterinarās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinarārstam.

V/MRP/08/1715

CP-Pharma Handelsges. mbH
Ostlandring 13
DE - 31303 Burgdorf
Vācija/ Vokietija

GTIN 04042668012403

Lot.
EXP: