

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

20.03.2024.

<p>Lot/Serija: EXP/Tinka iki:</p> <p>Tulathromycin/ Tulathromycin/ injekcinis tirpalas galvijām, kiaulēms ir avims/ injekcinis roztok pre hovādzī dobytok, ošipané a ovce</p> <p>100 mg/ml</p> 	<p>486318</p>		
<p>100 ml</p> 	<p> Liellopi, cūkas un aitas. Galvijai, kiaulēs ir avys hovādzī dobytok, ošipané a ovce</p> <p>Pēc atvēršanas izlietot līdz _____</p> <p>V/DCP/18/0079</p>	<p>Atidarius naudoti iki _____</p> <p>LT/2/19/2511/002</p>	<p>Po prvom otvorení použít do _____</p> <p>96/078/DC/18-S</p>
<p>100 mg/ml</p> <p>šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un aitām/ injekcinis tirpalas galvijams, kiaulēms ir avims/ injekcinis roztok pre hovādzī dobytok, ošipané a ovce</p> <p><i>Tulathromycin/ Tulathromycin/ Tulathromycinum</i></p>  <p>Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles. Tik veterināriem naudojami. Pardūodama tik su veterināriņu receptu. Len pre zvieratā. Vydaj lieku je viazany na veterināry predpis.</p> 	<p>1 ml satur 100 mg tulatromicīna.</p> <p>Pirms lietošanas izlasiet iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju.</p> <p><u>Ievadīšanas veids:</u> Liellopiem: s.c. Cūkām un aitām: i.m.</p> <p><u>Devā:</u> 1 ml zāļu/40 kg ķermeņa svara.</p> <p>Ierobežojumu periods: Liellopiem (galai un blakusproduktiem): 22 dienas. Cūkām (galai un blakusproduktiem): 13 dienas. Aitām (galai un blakusproduktiem): 16 dienas.</p> <p>Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. Nelietot grūšņiem dzīvniekiem 2 mēnešus pirms gaidāmajām dzemdībām, ja šo dzīvnieku pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.</p> <p><u>Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.</u> <u>Pēc atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.</u></p> <p>Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.</p> <p>Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.</p>	<p>1 ml yra 100 mg tulatromicīno.</p> <p>Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.</p> <p><u>Naudojimo metodas:</u> Galvijams: švirkšti po oda. Kiaulėms ir avims: švirkšti į raumenis.</p> <p><u>Dozė:</u> 1 ml vaisto/40 kg kūno svorio.</p> <p><u>Išlauka:</u> Galvijų skerdenai ir subproduktams – 22 paros. Kiaulių skerdenai ir subproduktams – 13 parų. Avių skerdenai ir subproduktams – 16 parų.</p> <p>Nepatvirtintas naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas naudoti žmonėms. Negalima naudoti vaikingsoms patelėms, kurių pienas numatomas naudoti žmonėms, 2 mėnesius iki tikėtino atsivedimo.</p> <p>Laikyti originalioje pakuotėje. Atidarius laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Tinkamumo laikas atidarius talpykloje – 28 d. Naikui imas: skaityti informacinį lapelį. Saugoti nuo vaikų.</p>	<p>1 ml obsahuje 100 mg tulatromycínu</p> <p>Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.</p> <p><u>Spôsob podania:</u> hovādzī dobytok: s.c. ošipané a ovce: i.m.</p> <p><u>Dávkovanie:</u> 1 ml veterinárneho lieku/40 kg živej hmotnosti</p> <p><u>Ochranná lehota:</u> Hovādzī dobytok (māso a vnūtornosti): 22 dñi. Ošipané (māso a vnūtornosti): 13 dñi. Ovce (māso a vnūtornosti): 16 dñi.</p> <p>Nie je registrovaný na použitie u zvierat produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu. Nepoužívať u gravidných zvierat, ktoré sú určené na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu počas 2 mesiacov pred očakávaným pôrodom.</p> <p>Uchovávať v pôvodnom obale. Po prvom otvorení uchovávať pri teplote do 25 °C. Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dñi.</p> <p>Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.</p>

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenija/ Slovēnija/ Slovinsko