

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

06.11.2019.

PSA020180 01 R1  
180x67x165 mm  
C M Y K

376703 R2



**CEFA-SAFE**  
300 mg suspensija ievadīšanai tesmenī  
liellopiem/intramaminē suspensija galvijams  
*Cefapirinum*  
20 injektori/švirkšņu +  
20 tīrīšanas salvetes/servetēliņi.

## CEFA-SAFE

Viens injektors (10 ml) satur:  
Cefapirins 300 mg (cefapirīna benzatīna veidā).

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto  
lietošanas instrukciju.

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Pienam: 1 diena pēc dzemdībām, ja cietstāves  
periods ir ilgāks par 35 dienām;  
36 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves  
periods ir 35 dienas vai īsāks.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Vienamē 10 ml švirkste yra 300 mg cefapirino  
(cefapirino benzatīno druskos).

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Išlauka:

skerdienu ir subproduktams – 21 para;

pienu:

1 para po apsiiveršiamo, jei užtrūkimo laikotarpis  
ilgesnis nei 35 dienos;  
36 paros po gydymo, jei užtrūkimo laikotarpis buvo  
35 dienos arba trumpesnis.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C  
temperatūroje.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinariui naudoti.

Parduodama tik su veterinariu receptu.

Saugoti nuo vaikų.

## CEFA-SAFE

300 mg suspensija  
ievadīšanai tesmenī  
liellopiem/intramaminē  
suspensija galvijams

*Cefapirinum*

20 injektori/švirkšņu +  
20 tīrīšanas salvetes/  
servetēliņi.




## CEFA-SAFE

300 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem/  
intramaminē suspensija galvijams

*Cefapirinum*

20 injektori/švirkšņu +  
20 tīrīšanas salvetes/servetēliņi.



Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Niederlande/Nyderlandai

V/NRP/96/0456  
LT/2/96/0327/001

Lot/EXP

imprint area  
Varnish Free

