

18-05-2018

Glucosol

400 mg/ml šķīdums Infūzijām
Ilelloplem un altām
Glucose

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
SIA „Bebra Serviss”
„Doktorāts”, Bebrenes pagasts,
Ilūkstes novads, LV-5439 Latvija



Par sērijas Izlaidi atbildīgais ražotājs:
Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19,49377 Vechta, Vācija



04/18 E1252164.LVL

Sērija: Derīgs līdz:

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot sekojošos
gadījumos:
Hiperglikēmija, hipokaliēmija,
nieru mazspēja (olīgūrija vai
anūrija), metabolā acidoze,
hiperhidratācija, hipotoniska
dehidratācija.
Nelietot subkutāni.

Uzglabāt bērniem
neredzamā un nepieejamā
vietā.

V/NRP/18/0026

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās
zāles.

750 ml

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Hiperglikēmija, elektrolītu līdzsvara traucējumi (hipokaliēmija, hipomagnēmija vai hipofosfatēmija), ūdens balansā traucējumi (hipervolemija).

Nepareiza infūzija var izraisīt ekstravazāciju, infekciju injekcijas vietā, lokālas sāpes, venozu kairinājumu vai flebītu, kas var rasties ārpus injekcijas vietas, vai trombozi.

Tiklīdz rodas blakusparādības, nekavējoties pārtrauciet infūziju.

Ja novērojot jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

MĒRĶA SUGAS

Ilellopi, aitas.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intravenozai ievadīšanai.

Lēnām intravenozām infūzijām, nepārsniedzot infūzijas ātrumu 0,5 ml/kg ķermeņa svara/ stundā.

Pirms infūzijas šķīdumu sasildīt līdz ķermeņa temperatūrai.

Ilellopiem: 200 – 400 g glikozes (atbilst 500 – 1000 ml uz dzīvnieku) katras 24 stundas.

Aitām: 48-80 g glikozes (atbilst 120 – 200 ml uz dzīvnieku) katras 24 stundas.

Deva jāpielāgo individuālajām kaloriju un šķidruma prasībām. Ieteicams kopējo devu sadalīt vairākās ievadīšanas reizēs dienas laikā.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Intravenozā infūzija jāveic lēnām.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu: Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Regulāri pārbaudīt glikozes līmeni asinīs, elektrolītu un šķidruma līdzsvaru.

Lietojojot lielās devās, pēc nepieciešamības pievienot kāliju un fosfātu.

Strauja hipertensīvo šķīdumu intravenoza ievadīšana var izraisīt flebītu vai trombu veidošanos injekcijas vietā.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Uzmanīties, lai izvairītos no nejausās (gadījuma rakstura) pašinjicēšanas, jo tas var izraisīt lokālu kairinājumu injekcijas vietā. Ja notikusi nejausa pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā
Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Nav zināma.

Pārdozēšana (sīptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)
Pārmērīga glikozes lietošana var radīt hiperglikēmiju, glikozūriju un poliūriju.

Būtiska nesaderība
Nav zināma.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU
VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO
ATKRITUMU IZNICINĀŠANAI
Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA
04/2018

CITA INFORMĀCIJA
Iepakojuma izmēri:
500 ml
750 ml
12 x 500 ml
12 x 750 ml
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

SIA „Bebra Serviss”
„Doktorāts”,
Bebrenes pagasts,
Ilūkstes novads,
LV-5439
Tel. +371 65407384
bebra@bebra.lv

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas izlietot nekavējoties. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.