

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

1 x 10 ml, 6 x 10 ml, 1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**PGF Veyx<sup>®</sup>**

0.092 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

*Cloprostenol sodium*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

**Sastāvs:**

1 ml satur:

*Aktīvā viela:*

0.092 mg kloprostenola nātrijs, ekvivalents 0.0875 mg kloprostenolam.

*Palīgvielas:*

1 mg hlorokrezols

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

1 x 10 ml

6 x 10 ml

1 x 20 ml

6 x 20 ml

1 x 50 ml

12 x 50 ml

**5. MĒRKA SUGAS**

Liellopi un cūkas

**6. INDIKĀCIJAS**

Liellopi:

- Meklēšanās un ovulācijas sinhronizācijai, meklēšanās sinhronizācijai dzīvniekiem ar ovulācijas ciklu, lietošanai diestrus fāzē.
- Progesterona radīta cikla blokādes gadījumā - anestrus, smags strutains dzimumorgānu iekaisums (katarāls iekaisums) vai piometra. Aborta izraisīšanai līdz 120 grūsnības dienai
- Mumificēti augļi
- Dzemdību izraisīšanai atsevišķiem dzīvniekiem.

Cūkas:

- Dzemdību ierosināšana un sinhronizācija, sākot no 114 grūsnības dienas (1. diena = pirmā diena pēc pirmās apsēklošanas)

## 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi:	gaļai un blakusproduktiem:	2 dienas
	pienam:	nulle dienas
Cūkas:	Gaļai un blakusproduktiem:	2 dienas

## 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads  
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā augstākā par 25 °C.  
Sargāt no gaismas.

## 12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

## 13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.  
Recepšu veterinārās zāles.

## 14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

## 15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH  
Söhreweg 6  
34639 Schwarzenborn  
Vācija

## 16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/00/1080

## 17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas Numurs:

03. 12. 2009

MARKĒJUMS  
V/NRP/00/1080

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

50 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**PGF Veyx®**

0.092 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

*Cloprostenol sodium*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

**Sastāvs:**

1 ml satur:

*Aktīvā viela:*

0.092 mg kloprostenola nātrijs, ekvivalents 0.0875 mg kloprostenolam.

*Palīgvielas:*

1 mg hlorokrezols

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

50 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi un cūkas

**6. INDIKĀCIJAS**

Liellopi:

- Meklēšanās un ovulācijas sinhronizācijai, meklēšanās sinhronizācijai dzīvniekiem ar ovulācijas ciklu, lietošanai diestrus fāzē.
- Progesterona radīta cikla blokādes gadījumā - anestrus, smags strutains dzimumorgānu iekaisums (katarāls iekaisums) vai piometra. Aborta izraisīšanai līdz 120 grūsnības dienai.
- Mumificēti augļi
- Dzemdību izraisīšanai atsevišķiem dzīvniekiem.

Cūkas:

- Dzemdību ierosināšana un sinhronizācija, sākot no 114 grūsnības dienas (1. diena = pirmā diena pēc pirmās apsēklošanas)

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas  
pienam: nulle dienas  
Cūkas: Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas

## **9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz: mēnesis/gads  
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.  
Sargāt no gaismas.

## **12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

## **13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Recepšu veterinārās zāles.

## **14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

## **15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Veyx-Pharma GmbH  
Söhreweg 6  
34639 Schwarzenborn  
Vācija

## **16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS**

V/NRP/00/1080

## **17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērijas Numurs:

03. 12. 2009

MARKĒJUMS  
V/NRP/00/1080

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

10 ml, 20 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

PGF Veyx®

0.092 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

*Cloprostenol sodium*

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

**Sastāvs:**

1 ml satur:

*Aktīvā viela:*

0.092 mg kloprostenola nātrijs, ekvivalents 0.0875 mg kloprostenolam.

*Palīgvielas:*

1 mg hlorokrezols

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

10 ml

20 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas

pienam: nulle dienas

Cūkas Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Sērijas numurs:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz: mēnesis/gads

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.