

MARKĒJUMS
V/NRP/98/0936

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 500 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Noromectin Injection

1% šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Ivermectine

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Ivermektīns 1,0% m/t (10 mg / 1 ml)

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Gaļas šķirņu un nelaktējoši slaucamo šķirņu liellopi un cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Greimošanas trakta apaļtārpu, plaušu apaļtārpu, acu tārpu, spindeļu, kašķa ērcu un utu invāziju ārstēšanai un apkarošanai* gaļas šķirņu un nelaktējošiem slaucamo šķirņu liellopiem.

Greimošanas trakta apaļtārpu, plaušu apaļtārpu, utu un kašķa ērcu invāziju ārstēšanai un apkarošanai* cūkām.

*Sīkāk skatīt lietošanas instrukcijā.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Liellopiem: ievadīt tikai subkutāni pleca priekšpusē vai aiz tā, devā 200 µg / kg (1 ml uz 50 kg ķermeņa svara).

Cūkām: ievadīt tikai subkutāni kakla rajonā, devā 300 µg / kg ķermeņa svara (1 ml uz 33 kg).

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopu gaļai un blakusproduktiem: 49 dienas. Cūkgaļai un blakusproduktiem: 28 dienas.
Aizliegts lietot laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Neinjicēt dzīvniekiem ar mitru vai netīru ādu. Neinjicēt intravenozi vai intramuskulāri. Noromectin Injection ir reģistrēts lietošanai tikai liellopiem un cūkām. Nelietot citām sugām, izņemot indikācijās norādītajām, jo var novērot smagas reakcijas, t.sk. nāves gadījumus suņiem.

Lietošanas laikā nesmēķēt vai neēst. Pēc iespējas samazināt tiešo ādas saskarsmi ar šīm veterinārajām zālēm. Pēc lietošanas mazgāt rokas. Rūpēties, lai novērstu nejaušu (gadījuma rakstura) pašinjekciju. Šīs veterinārās zāles var izraisīt lokālu kairinājumu un/vai sāpes injekcijas vietā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Pēc pirmās atvēršanas izlietot līdz: ___/___/___
Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Veterinārās zāles nesatur pretmikrobu konservantu. Pirms katras devas atvilkšanas noslaucīt atveri. Izmantot sausu sterilu adatu un šļirci.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Ivermektīns nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas ir bīstams zivīm un citiem ūdenī dzīvojošiem organismiem. Nepiesārņot ūdens tilpnes ar produktu vai izlietot konteineru.
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry, Co. Down BT35 6JP
Ziemeļīrija

16. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/98/0936

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}