

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

30.03.2023.

EXP

LOT

Cepedex®
0,5 mg/ml

1235/001



Cepedex®
0,5 mg/ml

**Sūstelahus koertele ja kassidele
Šķīdums injekcijām kaķiem
un suņiem**

**Injekcinis tirpalas šūnims
ir katēms**

Deksmedetomidīnvesniklorīd
Dexmedetomidine hydrochloride
Deksmedetomidīno hidrochlorīdas

10 ml

EE

1 ml satur: deksmedetomidīnvesniklorīd 0,5 mg (vastab 0,42 mg deksmedetomidīnīle)

Koerad: intravenoosselt vōi intramuskulaarselt. Kassid: intramuskulaarselt. Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

Kōlblikkusaeg pārast mahuti esmast avamist: 56 pāeva. Pārast korgi lābistamist kasutada kuni:

Hāvitamine: vt pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kātesaamatus kohas. Ainult veterinārsēks kasutamisēks. Retseptiravim.

EU/2/16/200/005

CP-Pharma Handelsges. mbH
Ostlandring 13, 31303 Burgdorf
Saksamaa/Vācija/Vokietija

LV

1 ml satur: Deksmēdetomidīna hidrohlorīds 0,5 mg (atbilst 0,42 mg deksmedetomidīna).

Suņi: intravenozai vai intramuskulārai lietošanai. Kaķi: intramuskulārai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Pēc flakona pirmreizējas atvēršanas izlietot 56 dienu laikā. Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz:

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

EU/2/16/200/005

LT

1 ml yra: deksmedetomidino hidrochlorido 0,5 mg (atitinka 0,42 mg deksmedetomidino)

Šūnims švirkšti į veną ar į raumenis. Katėms švirkšti į raumenis. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 56 dienos. Pradūrus kamštėlį, būtina sunaudoti iki:

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Saugoti nuo vaikų. Tik veterinarijam naudojimui. Parduodama tik su veterinariu receptu.

EU/2/16/200/005

GTIN: 04042668012359