

90205203


Advantix®

Tāpīlahus koertele
ūle 4 kg kuni 10 kg
Šķidums pilināšanai uz ādas
suņiem 4-10 kg
Uzlašīnamasis tīrpālas
>4-10 kg svorio šunims

**4 x
1,0 ml**

105 x 25 x 195


Advantix®

**4 kg -
10 kg**

Advantix®


Tāpīlahus koertele
ūle 4 kg kuni 10 kg
Šķidums pilināšanai uz ādas
suņiem 4-10 kg
Uzlašīnamasis tīrpālas
>4-10 kg svorio šunims

Imidaclopridum/Permethrinum


4 x 1,0 ml


APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

14.03.2022.


Advantix®


**Mitte manustada kassidele.
Nelietot kakjiem!
Negalima naudoti katēms.**

(E)

Ūks 1,0 ml pipetē saudab:
100 mg imidakloprīdi ja 500 mg permethrīni.
4 pipetē (4 x 1,0 ml)
– Kūrbunakšuse ravīks ning profilaktikaks; vūb kausatada kīrpudest tīngtūd atērlīgīse dermatīdī (FAD) ravīstātegeia osana.
– Vātvībat koeravāvid.
– Koeravīdī ja puēgnakšuse ravīks. Peleltava ja surmava toīne tōttū vāhēndab koerte vektōrīte poolī sīurātūd haiguste (nt borreliosis, riketsiozes ja erīlīhoos) edasīkandūmīse ohtū.
– Peleltab pīstēsāsēsed ja moekītōd, vāhēndades īeīsmīnoosī edasīkandūmīse ohtū.
– Peleltab pīstēkārībeēd, adates āra hōīda kārtēshammūstēstēst pōhjustatūd dermatīti. Aīnūt vāīspīdīseks kasūtāmīseks.

Enne ravīmi kasūtāmīst lugege pakēdī īnfōlēte.

Hōīda fōolūmpakēdī bīstērlēga vāīspakēdīs. Mītte kasūtada alla 7 nādāla varūstēl vōī alla 4 kg kaavvatēl kūsīkatēl. Kasūtada 24 kū pōksul pīrast fōolūmpakēdī avārstī vōī enne EXP ītēpu, kui sēe on lūhēm. Mītte laēta kūlmtūda. Pīrast fōolūmpakēdī avārstī hōīda kūvas kohas temperatūrīl kūnī 30 °C.

Hāvītāmīne: vt pakēdī īnfōlēte.

Aīnūt veterinārsēks kasūtāmīseks.

Kāsmīdīgīgrāvīm. Hōīda lastē eest varjātūd ja kīttēsamatūs kohas.

(V)

Vīena 1,0 ml pipetē saur:
100 mg imidakloprīdi, 500 mg permethrīni.
4 pipetē (4 x 1,0 ml)
– īznīcīna bīlūsas (ārēstēāna un kontrolē); var īletōt kā dāju nō ārstēānas stratēģījas pret bīlūsu alērgīskō dermatītu.
– īznīcīna grauzējūtīs.
– Aīvārā un īznīcīna ērēses, samazīnot vektōru pāmēsātō slīmībū (pīemēram, boreliozes, riketsiozes un erīlīhozes) rīskū suņīm.

Mūīglōla hōīdja/Regīstrācījas aplīcībās īpatnīeks/Regīstruotōjas:

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa/Vāģija/Vokietīja

Tootīja/Ražotājs/Gamītōjas:

KVP Pharma + Veterinār Produkte GmbH

Profensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Saksamaa/Vāģija/Vokietīja

(L)

1,0 ml pipetēje yra:
100 mg imidakloprido, 500 mg permethrino.
4 pipetės (4 x 1,0 ml)
– Naikina blūsas (gydymui ir profilaktikai); gali būti naudojamas kaip blūsu sukeltų alerginio dermatito (BAD) gydymo strategijos dalis.
– Naikina plaukagūžius.
– Naikina ir atbauda erkes; sumažina užsikrėtimo ektoparazitų pernešamosiomis ligomis (boreliozė, riketsiozė, erlichiozė) riziką.
– Atbauda uodus ir smėlines muses; sumažina užsikrėtimo laisvanorių riziką.
– Atbauda piktmuses; apsaugo nuo įkandimų sukeltų dermatitų.
Tik išoriam naudojimui.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Folijos maišelyje su tizdėmės plėkštelėmis laikyti kartoninėje dėžutėje.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 4 kg. Pažėdus originaliu folijos maišeliu, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. Negalima sušaldyti. Atidarius folijos maišelį, laikyti sausgje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Naikinti: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinarijai naudojimui. Saugoti nuo vaikų.

– Aīvārā odus un smīlšu mušās, samazīnot īeīsmīnūjū pāmēsānas rīskū.

– Aīvārā svīes mušās, pādīžēt novērst mušu kōdūmū īzrāsītō dermatītu.

Tīkai ārgīgai lētōšanai.

Pīrms lētōšanas īzāsīet ītepakojumam pīvīenbō lētōšanas īnstrukcīju.

Uzglābāt folījas maīstū ar bīstērlēm kārtonā kaslī. Nelīetot kūcīnīm līdž 7 nedēļu vēcūmam vai suņīm, kuru ķermēna svārs īr līdž 4 kg. īzīletot 24 mēnēsu laikā pīc alūmīnīja folījas maīstīna atvērīšanas vai līdž derīgūma termīna beigām, ja tas īr īsdīks. Nesacsaldēt.

Pīc alūmīnīja folījas maīstīna atvērīšanas uzglābāt sausā vītā un temperatūrā līdž 30 °C.

Atkrītūmū īznīcīnāsāna: īzāsīet lētōšanas īnstrukcīju.

Lētōšanai dzīvīekīm. Bezrecepūvū veterināras zāles. Uzglābāt bērniem nerādāmā un nepīejāmā vītā.

(L)

1,0 ml pipetėje yra:
100 mg imidakloprido, 500 mg permethrino.
4 pipetės (4 x 1,0 ml)
– Naikina blūsas (gydymui ir profilaktikai); gali būti naudojamas kaip blūsu sukeltų alerginio dermatito (BAD) gydymo strategijos dalis.
– Naikina plaukagūžius.
– Naikina ir atbauda erkes; sumažina užsikrėtimo ektoparazitų pernešamosiomis ligomis (boreliozė, riketsiozė, erlichiozė) riziką.
– Atbauda uodus ir smėlines muses; sumažina užsikrėtimo laisvanorių riziką.
– Atbauda piktmuses; apsaugo nuo įkandimų sukeltų dermatitų.
Tik išoriam naudojimui.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Folijos maišelyje su tizdėmės plėkštelėmis laikyti kartoninėje dėžutėje.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 4 kg. Pažėdus originaliu folijos maišeliu, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. Negalima sušaldyti. Atidarius folijos maišelį, laikyti sausgje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Naikinti: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinarijai naudojimui. Saugoti nuo vaikų.



(01)04007221049739

 Lot:
EXP:
