

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

29.08.2024.

Carprofelican®
50 mg/ml
Sūstelahus /
Šķīdums injekcijām /
Injekcinis tirpalas
Koer ja kass /
Suņi un kaķi /
Sunys ir katēs

LV: Katrs ml satur:
Karprofēns 50,0 mg
Intravenozai un subkutānai lietošanai.
Pēc pirmreizējas flakona atvēršanas
izlietot 28 dienu laikā.
Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot
līdz: / /
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).
Nesasaldēt.
Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā,
lai pasargātu no gaismas.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
instrukciju.
Lietošanai dzīvniekiem.
Uzglabāt bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā.

Le Vet. Beheer B.V.

EE: Müügiloa nr: 1776
LV: V/DCP/13/0022
LT: LT/2/13/2173/001

LT: vieno ml sudėtis:
karprofenas 50,0 mg
Leisti į veną arba po oda.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą
atidarius flakoną, – 28 d.
Pradurus kamštelį, sunaudoti iki:
 / /
Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima
sušaldyti.
Flakoną laikyti kartoninėje dėžutėje,
kad vaislas būtų apsaugotas nuo
šviesos.
Prieš naudojimą perskaityti
pakuotes lapelį.
Tik veterinariniam naudojimui.
Saugoti nuo vaikų.

Carprofelican®

50 mg/ml

Sūstelahus /
Šķīdums injekcijām /
Injekcinis tirpalas

Koer ja kass /
Suņi un kaķi /
Sunys ir katēs



20 ml



GTIN: 05701170434798

Lot:

Exp:

EE: Üks ml sisaldab:
karprofeen 50,0 mg
Intravenoosne ja subkutaanne.
Kõlblikkusaeg pärast vialali esmast
avamist: 28 päeva.
Pärast korgi läbistamist kasutada
kuni: / /
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida vialal välispakendis, valguse
eest kaitstult.
Enne ravimi kasutamist lugege
pakendi infolehte.
Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Hoida laste eest varjatud ja
kättesaamatus kohas.

