

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

04.08.2020.

50 mg

AMOXIBACTIN®  
vet

EE

Ūks tablett sisaldab:  
Toimeaine:  
Amoksitsilliini 50 mg  
(vastab 57,50 mg  
amoksitsilliintrihidraadile).

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist  
lugege pakendi infolehte.

Hoiatus manustajale! Penitsilliinid ja  
tsfalosporiinid võivad aeg-ajalt esile  
kutsuda tõsisel allergilisi reaktsioone.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi  
infolehte.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.  
Tableti kasutamata osa tuleb panna  
tagasi avatud blisterisse ja kasutada  
4 päeva jooksul.

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja  
kättesaamatus kohas.

Müügiloa nr: 1880

Lot:  
EXP/Tinka iki:

LV

1 tablete satur:  
Aktīvā viela:  
Amoksicilīns 50 mg (atbilst 57,50 mg  
amoksicilīna trihidrāta)

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas  
izlasiet iepakojumam pievienoto  
lietošanas instrukciju.

Brīdinājumi lietotājam: penicilīni un  
cefalosporīni dažkārt var izraisīt smagas  
alerģiskas reakcijas. Brīdinājumus  
lietotājiem izlasiet lietošanas instrukcijā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.  
Neizlietotās tablešu daļas ievietot  
atvērtajā blisterī un izmantot 4 dienu  
laikā.

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet  
lietošanas instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu  
veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un  
nepieejamā vietā.

V/DCP/14/0059



**Le Vet. Beheer B.V.**  
Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater  
Holland/Nyderlandai/Nīderlande

50 mg

AMOXIBACTIN®  
vet 50 mg

tabletīd koertele  
ja kassidele  
tabletēs šunims ir katēms  
tabletes suņiem un kaķiem

Amoksitsilliin/Amoksicilīnas/Amoxicillinum



100 tabletti/tablečīj/tabletes

LT

1 tableteje yra:  
veiklosios medžiagos:  
amoksicilino 50 mg  
(atitinka 57,50 mg amoksicilino  
trihidrato).

Sušerti. Prieš naudojimą būtina  
perskaityti informacinį lapelį.

Jspėjimai naudotojui: penicilinai ir  
cefalosporinai kartais gali sukelti  
sunkias alergines reakcijas. Išsamius  
jspėjimus naudotojui skaityti  
informaciniame lapelyje.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip  
30 °C temperatūroje. Bet kokios  
nepanaudotos tabletės dalys turi būti  
grąžintos į atvirą lizdinę plokštelę ir  
sunaudotos per 4 dienas.

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinarijoms naudojimui.

Parduodama tik su veterinarijū  
receptu.

Saugoti nuo vaikų.

LT/2/14/2260/010