

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

03.04.2022.



50 doziņ/devas

Porcilis
PRRS

383928 R1

Porcilis
PRRS

50 doziņ/devas

Vienoje dozēje gyvo nusilpninto
KRRSV 10^{4,0}-10^{6,3} TCID₅₀.

Švirksīti i raumenis.

2 ml 1 dozē.

Priēs naudojant būtina perskaityti
informacijā lapelē.

Išlauka: 0 parū.

Atskiedus sunaudoti per 3 val.

Laikyti šaldytuve.

Saugoti nuo šviesos.

Tik veterinarijāim naudojimui.

Parduodama tik veterinarijāos
gydytojūi.

Saugoti nuo vaikū.

Porcilis
PRRS

50 doziņ/devas

Intervet International B.V.
Wim de Kaverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nyderlandai/Niederlande
LT/2/02/1385/003
V/NRP/01/1401



Porcilis 
PRRS

LIOfILIZĀTAS INJEKCIŅEI SUSPENSIJAI
RUOŠTI KIAULĒMS
LIOfILIZĀTS SUSPENSIJAS INJEKCIJĀM
PAGĀTAVOŠĀNAI CŪKĀM

50 doziņ/devas

50 
MSD
Animal Health

Porcilis
PRRS

50 doziņ/devas

Viena deva satur: dzīvs, novājināts
CRRSV 10^{4,0} - 10^{6,3} TCID₅₀.

Intramuskulārai lietošanai.

1 deva (2 ml).

Pirms lietošanas izlasiet iepakojamam
pievienoto lietošanas instrukciju.

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

Pēc izšķidrināšanas izlietot 3 stundu
laikā.

Uzglabāt ledusskapī.

Sargāt no gaismas.

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošām
veterinārārstam.

Uzglabāt bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā.

PSA020026 01 R2

29.5x29.5x66 mm

C M Y K

Imprint area
Varnish free

Lot EXP

