



Paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas īpašnieks:
 SIA "Vetmarket", Eglaines iela 1,
 Ozolnieku novads, Ozolnieki, LV-3018,
 Tel.:+37129999662, www.vetmarket.lv
Veterināro zāļu pārmarķētājs:

Pārmarķēšanas sērijas Nr.:

Nobilis®
RT+IBmulti+ND+EDS

EMULSION FOR INJECTION (WATER-IN-OIL) **500 ml**
(1000 doses)

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS emulsija injekcijām. Katra 0,5 ml devu satur: IBV celms M41 ierosina $\geq 5,5 \log_2$ VN vienības, IBV celms 249g ierosina $\geq 4,0 \log_2$ VN vienības, ART celms But1#8544 ierosina $\geq 9,5 \log_2$ ELISA vienības, EDS'76 celms BC14 ierosina $\geq 6,5 \log_2$ HI vienības, NDV celms Clone 30 ierosina $\geq 4,0 \log_2$ HI vienības katrā 1/50 no devas, vai satur ≥ 50 PD50 vienības. Adjuvants: vazelinēļa. **Mērķa suga:** Vaislas un dējējvistas. Vakcīna pret infekciozo bronhītu (Masačūsetas un D274/D207), Ņūkāslas slimību, putnu rinotraheītu un oļu dēšanas samazināšanās sindromu. Intramuskulārām injekcijām. Labi saskalināt, atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai, lietot sterili vakcinācijas aprīkojumu bez gumijas daļām. **Pirms lietošanas** izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. **Ierobežojuma periods:** Nāle dāmas. Nejausa injicēšana ir bīstama – pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Derīguma termiņu sērijas Nr. skat aiz EXP un Lot. Pēc caurduršanas izlietot 3 stundu laikā. Uzglabāt ledusskapī (2-8°C). Nesasaldēt. Sargāt no gaismas. Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterināristam. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. **Reģistrācijas apliecības īpašnieks:** Intervet Ireland Limited (S) **Reģistrācijas apliecības Nr.** V/I/21/0024

Paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas īpašnieks:
 SIA „Vetmarket”, Eglaines iela 1, Ozolnieki, tālr. 29999662
Veterināro zāļu pārmarķētājs:
Pārmarķēšanas sērijas Nr.

Use sterile equipment without rubber parts.
 Store in a refrigerator (2°C to 8°C). Do not freeze. Protect from light.
 Allow vaccine to reach ambient temperature (15° - 25°C) before use.
 Shake the bottle vigorously before use and periodically during use.
 Opened bottles should be used within 3 hours.