

176,00 mm

75,00 mm

**EE**  
 Üks ml sisaldab:  
 Toimeaine:  
 Prokaiinbensüülpenitsilliin 300 mg  
 (vastab 175,8 mg bensüülpenitsilliinile)  
 Abiaine: metüülparahüdroksübensoaat E218 2,0 mg  
 Ainult intramuskulaarseks kasutamiseks.  
 Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
 Keeluaeg:  
 Veised: Lihale ja söödavatele kudedele: 10 päeva.  
 Piimale: 108 tundi (4,5 päeva).  
 Sead: Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.  
 Lambad: Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.  
 Ei ole lubatud kasutamiseks lammastel, kelle piima tarvitatakse inimestidele.  
 Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad mõnikord põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone. Lugege hoiatusi pakendi infolehtelt.

**Bimeda**

**PROCIPEN**  
 300 mg/ml süstesuspensioon veistele, lammastele ja sigadele / suspensija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām / injekcinē suspensija galvijams, avims ir kiaulēms

**Prokaiinbensüülpenitsilliin**  
**Benzylpenicillin procaine**  
**Benzilpenicilino prokainas**


**250 ml**

**LV**  
 Katrs ml satur:  
 Aktīvā viela:  
 benzilpenicilīna prokaīna sāls 300 mg  
 (atbilst 175,8 mg benzilpenicilīna)  
 Palīgvielas: metilparahidroksibenzoāts E218 2,0 mg

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.  
 Pärast avamist kasutada kuni: .../.../...  
 Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).  
 Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
 Retseptiravim.  
 Müügiloa nr: 2291

Lot:  
 EXP: 8PRO009

Varnish free area



**APSTIPRINĀTS**  
 Pārtikas un veterinārajā dienestā  
 19.08.2021.

P1; FRONT (TOP LAYER)

NEUTRALIZATION + RELEASE VARNISH  
 Glue Side

P2; FRONT (GLUE SIDE)  
 NEUTRALIZATION + RELEASE VARNISH

15,00 mm

5,00 mm

Tikai intramuskulārai lietošanai.  
 Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.  
 Liellopiem:  
 Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas.  
 Pienam: 108 stundas (4,5 dienas).  
 Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.  
 Aitām: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.  
 Nav reģistrēts lietošanai aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.  
 Reizēm penicilīni un cefalosporīni var izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas. Skatīt informāciju lietošanas instrukcijā, sadaļā "Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā".  
 Derīguma termiņš pēc pirmreizējas flakona caurduršanas: 28 dienas. Pēc pirmreizējas caurduršanas, izlietot līdz: .../.../...  
 Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).  
 Lietošanai dzīvniekiem.  
 Receptu veterinārās zāles.  
 V/DCP/21/0035

**LT**  
 Kiekvienamē ml yra:  
 veikliosios medžiagos:  
 benzilpenicilino prokaino 300 mg  
 (atitinka 175,8 mg benzilpenicilino);  
 pagalbinės medžiagos: metilo parahidroksibenzoato E218 2,0 mg  
 Švirkšti tik į raumenis.  
 Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.  
 Išlauka:  
 Galvijai: Skerdienai ir subproduktams - 10 parų.  
 Pienui - 108 val. (4,5 paros).

Kiaulės: Skerdienai ir subproduktams - 7 paros.  
 Avys: Skerdienai ir subproduktams - 4 paros.  
 Neregistruotas naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.  
 Penicilinai ir cefalosporinai kartais gali sukelti sunkias alergines reakcijas.  
 Naudojimo įspėjimus žr. informaciniame lapelyje.  
 Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius flakoną: 28 paros. Atidarius sunaudoti iki: .../.../...  
 Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C).  
 Tik veterinariniam naudojimui.  
 Parduodama tik su veterinariniu receptu.  
 LT/2/21/2658/002  
**Bimeda Animal Health Limited**  
 2, 3 & 4 Airton Close, Airton Road  
 Tallaght, Dublin 24, Iirimaa/ Īrija/ Airija

P3; FRONT (BOTTOM LAYER)