

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

19.08.2021.

PROICIPEN

EXP:

Lot:

Bimeda

PROICIPEN

300 mg/ml süstesuspensioon veistele,
lammastele ja sigadele / suspensija
injekcijām liellopiem, aitām un cūkām /
injekcinē suspensija galvijams, avims ir
kiaulēms

Prokainbensūilpenitsilliin
Benzilpenicillin procaine
Benzilpenicilino prokainas

EE

Üks ml sisaldab: Toimeaine:
Prokainbensūilpenitsilliin 300 mg
(vastab 175,8 mg bensūilpenitsilliinile)
Abiaine: metüülparahüdroksübensoaat
E218 2,0 mg
Ainult intramuskulaarseks kasutamiseks.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Keeluaeg:
Veised: Lihale ja söödavatele kudedele: 10 päeva.
Piimale: 108 tundi (4,5 päeva).
Sead: Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.
Lambad: Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks lammastel, kelle piima
tarvitatakse inimtoiduks.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad mõnikord
põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone. Lugege
hoiatusi pakendi infolehtelt.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.
Pärast avamist kasutada kuni:/...../.....

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Müügiloa nr: 2291

LV

Katrs ml satur:

Aktīvā viela:
benzilpenicilīna prokaīna sāls 300 mg
(atbilst 175,8 mg benzilpenicilīna)
Palīgvielas: metilparahidroksibenzoāts
E218 2,0 mg

Tikai intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto
lietošanas instrukciju.

Liellopiem:

Gājai un blakusproduktiem: 10 dienas. Pienam:

108 stundas (4,5 dienas).

Cūkām: Gājai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Aitām: Gājai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai aitām, kuru pienu
paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Reizēm penicilīni un cefalosporīni var izraisīt



250 ml

Bimeda

PROICIPEN

300 mg/ml süstesuspensioon veistele,
lammastele ja sigadele / suspensija
injekcijām liellopiem, aitām un cūkām /
injekcinē suspensija galvijams, avims ir
kiaulēms

Prokainbensūilpenitsilliin
Benzilpenicillin procaine
Benzilpenicilino prokainas

nopietnas alergiskas reakcijas. Skatīt informāciju
lietošanas instrukcijā, sadaļā "Īpaši piesardzības
pasākumi lietošanā".

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas flakona
caurduršanas: 28 dienas. Pēc pirmreizējas
caurduršanas, izlietot līdz:/...../.....

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas
instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

V/DCP/21/0035

LT

Kiekvienam ml yra: veikliosios medžiagos:

benzilpenicilino prokaino 300 mg,

(atitinka 175,8 mg benzilpenicilino);

pagalbinės medžiagos:

metilo parahidroksibenzoato E218 2,0 mg

Švirkšti tik į raumenis.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Išlauka:

Galvijai: Skerdienai ir subproduktams - 10 parų.

Pienui - 108 val. (4,5 paros).

Kiaulės: Skerdienai ir subproduktams - 7 paros.

Avys: Skerdienai ir subproduktams - 4 paros.

Neregistruotas naudoti avims, kurių pienas skirtas

žmonių maistui.

Penicilina ir cefalosporinai kartais gali sukelti

sunkias alergines reakcijas. Naudojimo įspėjimus

žr. informaciniame lapelyje.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius flakoną: 28

paros. Atidarius sunaudoti iki:/...../.....

Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C).

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su

veterinariniu receptu.

Saugoti nuo vaikų.

LT/2/21/2658/002

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close, Airton Road

Tallaght, Dublin 24

Iirimaa/ Trija/ Airija

8PRO229

