

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0023

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba, 1 g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil

50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem un cūkām.
Ceftiofur (as ceftiofur sodium)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs flakons satur 1g ceftiofūra (kā nātrija sāls) pulveri.
Katrs šķīdinātāja flakons satur 20 ml Injekciju ūdens.
Šķīdinājums satur 50 mg/ml ceftiofūra.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 g pulvera flakons [30 ml]
20 ml šķīdinātāja flakons [30 ml]

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas.

6. INDIKĀCIJAS

Bakteriālas izcelsmes elpošanas ceļu slimības ārstēšanai liellopiem un cūkām. Starppirkstu nekrobacilozes (nagu puve) ārstēšanai liellopiem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Tikai intramuskulārai ievadīšanai.

Šķīdināšana

1g flakons: šķīdināt pievienojot 20 ml injekciju ūdens.

Lai atvieglotu šķīdināšanu lietot 18G adatu. Strauja šķīdinātāja pievienošana dod labāku rezultātu.

Devas liellopiem un cūkām.

Mērķa sugas	Devas	Devas šķīdinājumam	Indikācijas	Lietošanas biežums
Liellopi	1 mg/kg	1ml/50kg	Elpošanas ceļu slimības	Vienreiz dienā ar 24 stundu intervālu 3-5 dienas

			Nagu puve	Vienreiz dienā ar 24 stundu intervālu 3 dienas
Cūkas	3 mg/kg	1ml/16kg	Elpošanas ceļu slimības	Vienreiz dienā ar 24 stundu intervālu 3 dienas

Neievadīt vairāk kā 10 ml vienā injekcijas vietā.

Ievadīšana

Liellopiem un cūkām jāievada tikai intramuskulāri. Cūkām jāizvairās no injekcijas taukaudos. Injicējot jāievēro aseptika.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Pienam: nulle dienas.

Cūkas Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Brīdinājums: Penicilīni/cefalosporīni dažkārt var būt par cēloni smagām alerģiskām reakcijām.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Atvērtu izlietot līdz.....

Veterināro zāļu derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas: 24 stundas glabājot ledusskapī (2-8°C)

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizšķīdinātu produktu un šķīdinātāju uzglabāt ledusskapī (2-8°C)..

Pēc izšķīdināšanas produktu var uzglabāt ledusskapī (2-8°C) ne ilgāk kā 24 stundas.

Jebkurš izšķīdināts produkts pēc noteiktā perioda jābrāķē.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām .

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:

Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co Down
Ziemeļīrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/DCP/09/0023

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0023

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons, 1g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil

50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem un cūkām.
Ceftiofur (as ceftiofur sodium)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Katrs flakons satur 1g ceftiofūra (kā nātrija sāls) pulveri, kas jāizšķīdina 20 ml Injekciju ūdens.

Katrs ml gatava šķīdinājuma satur 50 mg ceftiofūra.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 g (30 ml flakons)

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Tikai intramuskulārai ievadīšanai liellopiem un cūkām.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.
Pienam: nulle dienas.

Cūkas Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

Ražošanas datums:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Atvērtu izlietot līdz.....

Veterināro zāļu derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas: 24 stundas uzglabājot ledusskapī (2-8°C).

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

Penicilīni un cefalosporīni dažkārt var būt par cēloni nopietnām alerģiskām reakcijām.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

21.04.2010

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0023

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons šķīdinātājam, 20 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ūdens Cefenil 50 mg/ml pulvera izšķīdināšanai, šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem un cūkām.

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Produkts satur 100% m/m Injekciju ūdens.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Šķīdinātājs Cefenil 50 mg/ml pulvera izšķīdināšanai, šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem un cūkām.

Intramuskulārai ievadīšanai liellopiem un cūkām.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto Cefenil lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nelietot tikai šķīdinātāju.

Pirms lietošanas skatīt Cefenil iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.