

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1 x 10 ml, 6 x 10 ml, 1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 1 x 50 ml

1. VETERIĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gonavet Veyx[®]

0.05 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur-

Aktīvā viela:

Gonadorelīns[6-D-Phe], kas atbilst 0.0524 mg gonadorelīna [6-D-Phe] acetāta

0.05 mg

Palīgvielas:

Hlorokrezols 1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 ml

6 x 10 ml

1 x 20 ml

6 x 20 ml

1 x 50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi

6. INDIKĀCIJAS

Ar reprodukciju saistīto procesu kontrolei un stimulācijai liellopiem un cūkām. Olnīcu darbības traucējumu un dzimumorgānu disfunkcijas ārstēšanai liellopiem un zirgiem.

Liellopi:

- Ovulācijas indukcija LH deficīta gadījumā
- Ovulācijas indukcija/sinhronizācija
- Olnīcu stimulācija 12. dienā pēc dzemdībām
- Olnīcu cistas (LH deficīta radītās)

Cūkas:

- Ovulācijas indukcija/sinhronizācija

Zirgi:

- LH deficīta izraisīti reproduktīvā cikla traucējumi(anoestrus, acyclia)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārām un subkutānām injekcijām.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā)

<u>Liellopi, cūkas, zirgi:</u>	Gaļa un blakusprodukti: nulle dienas
<u>Liellopi, zirgi:</u>	Piens: nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz mēnesis/gads
Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NOSACĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, KAS PALIEK PĒC TO LIETOŠANAS

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāizlieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem
Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/NRP/99/1033

17. RAŽOTĀJA SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

09. 07. 2009

MARKEJUMS
V/NRP/99/1033

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
10 ml, 20 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gonavet Veyx[®]

0.05 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

1 ml satur-

Aktīvā viela:

Gonadorelīns[6-D-Phe], kas atbilst 0.0524 mg gonadorelīna [6-D-Phe] acetāta

0.05 mg

Palīgvielas:

Hlorokrezols 1 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

20 ml

4. IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi, cūkas, zirgi:

Gaļa un blakusprodukti:

nulle dienas

Liellopi, zirgi:

Piens:

nulle dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz mēnesis/gads

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

09. 07. 2009

MARKEJUMS
V/NRP/99/1033

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA
50 ml

1. VETERIĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gonavet Veyx[®]

0.05 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur-

Aktīvā viela:

Gonadorelīns[6-D-Phe], kas atbilst 0.0524 mg gonadorelīna [6-D-Phe] acetāta

0.05 mg

Palīgvielas:

Hlorokrezols 1 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi

6. INDIKĀCIJAS

Ar reprodukciju saistīto procesu kontrolei un stimulācijai liellopiem un cūkām. Olnīcu darbības traucējumu un dzimumorgānu disfunkcijas ārstēšanai liellopiem un zirgiem.

Liellopi:

- Ovulācijas indukcija LH deficīta gadījumā.
- Ovulācijas indukcija/sinhronizācija
- Olnīcu stimulācija 12. dienā pēc dzemdībām.
- Olnīcu cistas (LH deficīta radītās)

Cūkas:

- Ovulācijas indukcija/sinhronizācija

Zirgi:

- LH deficīta izraisīti reproduktīvā cikla traucējumi(anoestrus, acycilia)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

8. Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā)

Liellopi, cūkas, zirgi:

Gaļa un blakusprodukti:

nulle dienas

Liellopi, zirgi:

Piens:

nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz mēnesis/gads

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NOSACĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, KAS PALIEK PĒC TO LIETOŠANAS

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāizlieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6

34639 Schwarzenborn

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/NRP/99/1033

17. RAŽOTĀJA SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs: